



SINCE 1989

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

KP1, Đường Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38733666 - Fax: (028) 38733003 - Website: www.spchcmc.vn



Hàng Việt Nam Chất lượng cao liên tục từ năm **2005** đến nay

ISO 9001 : 2015 - ISO/IEC 17025 - ISO 14001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
SAIGON PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

THUỐC TRỪ BỆNH



SPC cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng
thỏa mãn ước vọng vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC Xanh, Thêm Xanh

HƯỚNG DẪN AN TOÀN



Đọc kỹ nhãn thuốc
trước khi sử dụng




Mặc quần áo bảo hộ
khi phun thuốc



Không phun thuốc
ngược chiều gió



Tắm rửa thay quần áo
sau khi phun thuốc



Để thuốc xa tầm với
của trẻ em



Không làm nhiễm bẩn
môi trường khi dùng thuốc



SINCE 1989

Lời giới thiệu

Các loại thuốc Bảo Vệ Thực Vật do **Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn** cung ứng bao gồm nhiều chủng loại đang được bà con nông dân mọi miền trong cả nước sử dụng.

Với mục đích phòng trừ dịch hại hiệu quả, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Đội ngũ chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật của Công ty đã không ngừng cải tiến tìm ra những giải pháp hữu hiệu giúp bà con nông dân cả nước đạt được những vụ mùa bội thu.

Để giúp Bà con nông dân hiểu rõ đặc tính, cách sử dụng đúng và an toàn các loại thuốc BVTV do Công ty cung ứng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. **Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn** xin trân trọng giới thiệu tới bà con nông dân cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV này.

Công ty rất mong nhận được những đóng góp quý báu và sự hợp tác hỗ trợ của bà con nông dân, các cơ quan đơn vị và các bạn để phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt.

MỤC LỤC

- 1) Alpine 80WG; 80WP
- 2) Clearner 75WP
- 3) Copforce Blue 51WP
- 4) Dipomate 430SC
- 5) Dipomate 80WP
- 6) Hạt Vàng 250SC
- 7) Hạt Vàng 50WP
- 8) Hỏa Tiễn 50SP
- 9) Kisaigon 10GR
- 10) Kisaigon 50EC
- 11) Lúa Vàng 20WP
- 12) Lunasa 25EC
- 13) Luster 250SC
- 14) Mexyl MZ 72WP
- 15/ Pyrolax 250EC

- 16) Sagograin 300EC
- 17) Sagoperfect 320SC
- 18) Saipan 2SL
- 19) Saipora Super 350SC
- 20) Saizole 5SC
- 21) Samet 25EC
- 22) Sulox 80WP
- 23) Treppach Bul 607SL
- 24) Trizole 400SC
- 25) Trizole 75WG
- 26) Trizole 75WP
- 27) Vanicide 5SL
- 28) Vanicide 5WP
- 29) XinAzo 250SC
- 30) Zin 80WP
- 31) Zineb Bul 80WP



HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
LIÊN TỤC TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY



THUỐC TRỪ
NẤM BỆNH




80 WG 80 WP

Thành Phần:

Fosetyl - Aluminium: 80 % w/w
Chất mang, phụ gia: 20 % w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh

Lưu Dẫn 2 Chiều - Trị Nhiều Bệnh Khó !



Thối rữa Dưa hấu



Mốc sương Nho



Xi mủ cây có múi



Xi mủ, loét sọc miệng cạo



Thối nhũn bắp cải



Bạc lá lúa

CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ nấm bệnh nội hấp, có khả năng lưu dẫn hai chiều trong cây. Hiệu lực phòng trừ bệnh cao và kéo dài.
- Phòng trừ các bệnh sương mai, thối rữa, nứt thân xì mủ, bạc lá,... trên nhiều cây trồng khác nhau như cà chua, dưa hấu, dưa leo, cam, quýt, nho, rau màu và hoa cây cảnh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:



CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG
Dưa hấu	Thối rữa	Pha 40 - 60 g/bình 16 - 25 lít nước. Phun ướt đầm lá và thân cây.
Cam (cây có múi)	Xi mủ	0,25 %. Pha 25 g/10 lít nước. Gọt sạch vết bệnh rồi quét thuốc lên vết bệnh.
Tiêu	Chết nhanh	0,2 - 0,25 %. Pha 200 - 250 g/100 lít nước. Phun ướt đều lá khi bệnh vừa xuất hiện.
Lúa	Bạc lá lúa (Cháy bìa lá)	1,0 kg/Ha. Pha 40 - 60 g/bình 16 - 25 lít nước.
Nho	Mốc sương (sương mai)	0,2 - 0,25 %. Pha 200 - 250 g/100 lít nước. Lượng nước phun 400 lít/Ha.
Cao Su	Thối thân xì mủ	0,2 %. Pha 20g trong 10 lít nước. Gọt sạch vết bệnh rồi bôi thuốc lên
Phong Lan	Thối đen	Pha 40 - 60 g/bình 16 - 25 lít nước. Phun ướt đều cây khi bệnh mới xuất hiện.

LƯU Ý: Đối với cây trồng cạn, do đặc tính lưu dẫn 2 chiều nên có thể phun hoặc tưới thuốc vào gốc cây trồng.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày (Nho 7 ngày).



CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG
Tiêu	Chết nhanh	Pha 50 - 75 g/bình 16 - 25 lít nước hoặc 300 g/100 lít nước. Lượng nước phun 400 lít/Ha.
Hoa, Cây Cảnh	Bệnh Sương mai	Pha 50 - 100 g/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun 400 - 500 lít/Ha.

CHÚ Ý:

- Phun thuốc khi vết bệnh mới xuất hiện, nếu thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển nên phun lại lần 2 cách lần thứ nhất 5 - 7 ngày.

Thuốc Trừ Bệnh Cây

CLEARNER 75 WP

Thành Phần:

Chlorothalonil: 75 % w/w.
Chất mang, phụ gia: 25 % w/w.

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Đặc trị: Thán thư Ớt, Xoài,
Sẹo cây Cam và Sương mai Dưa hấu.



CLEARNER 75 WP là thuốc trừ nấm, tác động tiếp xúc, phổ tác dụng rộng. Dùng đặc trị các bệnh thán thư Ớt, xoài, sẹo cam, quýt và bệnh sương mai dưa hấu.

Hướng dẫn sử dụng:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ SỬ DỤNG
Ớt	Thán thư	1.2 kg/Ha. Pha 60 g/bình 20 - 25 lít nước.
Dưa hấu	Sương mai	1.5 kg/Ha. Pha 75 g/bình 20 - 25 lít nước.
Xoài	Thán thư	0.25 %. Pha 250 g/100 lít nước.
Cam	Sẹo	

Lưu ý: Phun khi tỷ lệ bệnh từ 3 - 5 %.

Lượng nước phun cho Ớt và dưa hấu: 400 - 500 lít/Ha. Xoài và Cam: 600 - 800 lít/Ha.

Thời gian cách ly: 5 ngày/ Ớt và 7 ngày/ xoài, cam và dưa hấu.



THUỐC TRỪ BỆNH CÂY

COPFORCE BLUE 51 WP

Thành phần: Copper Oxychloride:... 17 % w/w
Zineb:..... 34 % w/w
Chất mang, phụ gia:... 49 %

SPC Xanh, Thêm Xanh



CÔNG DỤNG

Copforce Blue 51 WP được phối hợp 2 hoạt chất, đặc biệt có gốc đồng, nên phổ tác dụng rất rộng đối với các loại bệnh hại quan trọng, trên nhiều loại cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Cà phê	Rỉ sắt	1.0 - 1.25 kg/Ha Pha 200 - 250 g/100 lít nước.
Lạc (đậu phộng)	Thán thư	Pha 0.5 % Pha 500 g/100 lít nước.
Khoai tây	Mốc sương	2.0 - 2.5 kg/Ha Pha 80 - 100 g/bình 20 lít nước.
Hoa hồng	Đốm đen	1.5 kg/Ha Pha 60 g/bình 20 lít nước.

LƯU Ý:

- Lượng nước phun: 500 lít/Ha, riêng hồ tiêu: 600 - 850 lít/Ha.
Phun ngừa khi vườn có nguy cơ bị bệnh, hoặc khi bệnh mới chớm xuất hiện.
Phun lặp lại 5 - 7 ngày sau, khi thời tiết mưa ẩm phù hợp cho bệnh phát triển.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY

DIPOMATE

430 SC
80 WP

Thành Phần:
Mancozeb.

SPC Xanh, Thơm Xanh



PHÒNG TRỪ NẤM BỆNH GÂY HẠI
TRÊN CÂY TRỒNG

- CÔNG DỤNG:**
- Hoạt chất Mancozeb trong danh mục thuốc BVTV ở VN được đăng ký và sử dụng để trừ nhiều loại bệnh nguy hiểm như:
- * Bệnh thán thư trên xoài, điều, cà phê, ớt, dưa hấu, cây ăn trái, ...
 - * Bệnh rỉ sắt trên cà phê, hoa cúc, lạc (đậu phộng), đậu tương, ...
 - * Bệnh đạo ôn, đốm nâu, khô vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm trên lúa.
 - * Bệnh sương mai, mốc sương hại trên cà chua, khoai tây, dưa hấu, dưa leo, bầu, bí, mướp, nho,...
 - * Bệnh chết nhanh thối gốc chảy mủ trên sầu riêng, cam quýt, tiêu,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG	
		430 SC	80 WP
LÚA	Lem lép hạt	3,0 lít/Ha. Pha 120 - 180 ml cho bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun: 400 - 600 lít/Ha.	1,5 kg/Ha. Pha 60 - 90 g/bình 16 - 25 lít nước, Phun 400 - 500 lít nước cho 1 Ha. Phun trước khi lúa trổ 3 - 5 ngày.
CÀ CHUA	Sương mai		2,0 kg/Ha. Pha 80 g/bình 16 lít nước, Phun 320 - 400 lít nước cho 1 Ha.
HOA CÚC	Gỉ sắt		

- LƯU Ý:**
- Có thể pha chung với nhiều loại thuốc sâu bệnh khác.
- THỜI GIAN CÁCH LY:** Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH

HẠT VÀNG 250 SC

Thành phần: Iprodione: 250 g/l
Dung môi, chất phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh



ĐẶC TRỊ BỆNH
LEM LÉP HẠT LÚA VÀ BỆNH ĐỐM TRÁI NHÃN



CÔNG DỤNG

HẠT VÀNG 250 SC là thuốc trừ bệnh cây, có tác dụng tiếp xúc và nội hấp, phổ rộng, phòng trừ bệnh lem lép hạt lúa và bệnh đốm trái nhãn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Lúa	Lem lép hạt	0,7 lít/Ha. Pha 30 - 40ml/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun 400 lít/Ha.
Nhãn	Đốm quả (thâm kim)	Pha 300 ml/100 lít nước. Phun ướt đều cây trồng.

LƯU Ý:

- Phun khi lúa sắp trổ hay sau khi trổ đều.
- Phun ướt đều cây nhãn khi trái còn non, bệnh mới xuất hiện
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác, ngoại trừ thuốc có tính kiềm cao.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH

HỎA TIẾN 50 SP

Thành phần: Quinalphos: 400 g/l
Dung môi, chất phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thêm Xanh

Dùng cho phun DRONE



CÔNG DỤNG

HỎA TIẾN 50 SP là thuốc thể hệ mới, có khả năng nội hấp mạnh và lưu dẫn trong cây, phổ biến tác dụng rất rộng với nhiều loại dịch hại, đặc trị bệnh vi khuẩn.
HỎA TIẾN 50 SP còn có khả năng kích thích cây trồng phát triển tốt.
- Thuốc rất ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Lúa	Vi khuẩn bạc lá/cháy bìa lá lúa	0,5 kg/Ha. Pha 25 g/ bình 20 - 25 lít nước. Lượng nước phun 2 bình /1000 m2. - Đối với Drone: Pha 500g/ bình 20 - 30 lít nước để phun cho 1 Ha. - Phun thuốc khi mép lá hoặc ngọn lá lúa có vết bệnh bạc lá mới xuất hiện, bệnh thường xảy ra ở giai đoạn lúa ôm dòng đến trổ bông. - Nếu bệnh đã phát triển, nên phun thuốc 2 lần, cách nhau 7 ngày. - Không pha chung với thuốc có tính kiềm.

LƯU Ý:

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH

KISAIGON

10 GR

Thành phần: Iprobenfos: 100 g/l
Dung môi, chất phụ gia: 90 g/kg

SPC Xanh, Thêm Xanh



ĐẶC TRỊ BỆNH

- ĐẠO ÔN
- THỐI THÂN HẠI LÚA

CÔNG DỤNG

KISAIGON 10 GR là thuốc trừ nấm nội hấp, gốc lân hữu cơ, có cùng lúc 2 tác dụng phòng và trị **KISAIGON 10 GR** là thuốc trừ bệnh dạng hạt đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông, ngoài ra còn phòng trừ hữu hiệu bệnh thối thân hại lúa.

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng	Cách dùng
Lúa	Bệnh đạo ôn lá (cháy lá)	25 - 30 kg/Ha	Rải thuốc xuống ruộng lúa, khi rải cần giữ mực nước ruộng từ 3-5 cm trong 5-7 ngày.
	Đạo ôn cổ bông thối (cổ bông)	25 - 40 kg/Ha	
	Bệnh thối thân	25 - 30 kg/Ha	

LƯU Ý:

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng rải thuốc trước thu hoạch 21 ngày.

- Phun khi lúa sắp trở hay sau khi trở đều.
- Phun ướt đều cây nhãn khi trái còn non, bệnh mới xuất hiện
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác, ngoại trừ thuốc có tính kiềm cao.

THUỐC TRỪ BỆNH

KISAIGON

50 EC

Thành phần: Iprobenfos..... 50 % w/w
Phụ gia, dung môi... 50 % w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh



ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẠO ÔN, KHÔ VẼN HẠI LÚA

CÔNG DỤNG

KISAIGON 50 EC là thuốc trừ nấm nội hấp tác dụng chủ yếu phòng trừ bệnh đạo ôn (lá và cổ bông), khô vằn (đốm vằn) hại lúa

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Lúa	Bệnh đạo ôn (Lá và cổ bông)	1,0 - 2,0 lít/Ha. Pha 80 - 120 ml/ bình 16 - 25 lít nước
	Bệnh khô vằn (Đốm vằn)	

LƯU Ý:

- Lượng nước sử dụng: 400 lít nước/Ha
- Phun thuốc khi có đốm bệnh mới xuất hiện
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác trừ thuốc có tính kiềm.
- Lắc đều chai thuốc trước khi sử dụng.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 21 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY

Lúa Vàng 20 WP

Thành Phần: Tricyclazole 6 % w/w
Iprobenfos 14 % w/w
Chất mang, phụ gia 80 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Sử dụng Lúa Vàng,
Hạt càng chắc đẹp



Đặc trị bệnh đạo ôn lá



Đặc trị đạo ôn cổ bông



CÔNG DỤNG:

- Thuốc phòng trừ nấm bệnh đạo ôn trên lúa, tác động tiếp xúc và nội hấp, hiệu quả phòng trừ bệnh cao.
- Thuốc phòng trị tốt các bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, cổ gié.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
LÚA	Bệnh Đạo ôn (cháy lá, khô cổ bông, thối cổ rễ)	1,0 kg/Ha. Pha 40 - 60 g cho bình 16 - 25 lít nước. Phun ướt đều.

LƯU Ý: Phun ngừa hoặc phun khi bệnh chớm xuất hiện trên đồng.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.



THUỐC TRỪ BỆNH

LUNASA[®] 25 EC

THÀNH PHẦN: Propiconazole: 250 g/L
Chất gây nhũ, dung môi cho đủ 1lít.

SPC Xanh, Thơm, Xanh



PHÒNG TRỪ

LEM LÉP HẠT LÚA VÀ BỆNH RỈ SẮT CÀ PHÊ



CÔNG DỤNG

LUNASA 25 EC là thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp, phổ rộng, hiệu lực diệt nấm nhanh và mạnh. Liều dùng thấp.

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Lúa	Lem lép hạt	0,25 - 0,5 lít/Ha. Pha 20 - 30ml/ bình 16 - 25 lít nước. Phun 400 lít/Ha.
Cà phê	Rỉ sắt	0,3 - 0,5 lít/Ha. Pha 100 ml/ bình 100 lít nước Phun 400 - 800 lít nước/Ha.

LƯU Ý:

- Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Nếu bệnh đã phát triển mạnh nên phun thuốc 2 lần, cách nhau 7 - 10 ngày
- Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác trừ thuốc có tính kiềm cao như dung dịch Bordeaux.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH

LUSTER^{250 SC}

Thành phần: Pencycuron: 250 g/l
Dung môi, phụ gia đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thơm Xanh



ĐẶC TRỊ
Bệnh khô vằn
Lở cổ rễ
Chết cây con

CÔNG DỤNG

LUSTER 250 SC là thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp, phổ rộng, hiệu lực diệt nấm nhanh và mạnh. Liều dùng thấp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Bệnh hại	Liều Lượng
Bệnh Khô vằn (đốm vằn)	1.0 lít/Ha. Pha 30 - 50ml cho bình 16 - 25 lít nước Phun: 500 lít/Ha.

LƯU Ý:

- Phun khi bệnh mới xuất hiện gây hại.
- Nếu bệnh đã gây hại nhiều trên ruộng, nên phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ
BỆNH CÂY

Mexyl MZ
72 WP

Thành Phần: Metalaxyl: 8 % w/w
Mancozeb: 64 % w/w
Chất mang, phụ gia: 28 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

**Sử dụng Mexyl
Hết nhìn thấy bệnh**



CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ bệnh phổ rộng kết hợp 2 hoạt chất Metalaxyl với Mancozeb tiếp xúc trực tiếp và lưu dẫn, tác dụng phòng và trị bệnh, hiệu lực nhanh và kéo dài.
- Đặc trị các bệnh sương mai (mốc sương), nứt thân, xì mủ, loét sọc miệng cạo... trên các cây cao su, hồ tiêu, rau màu các loại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:


CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
TIÊU	Chết nhanh	0,3 - 0,45 %. Pha 300 - 450 g/100 lít nước.
CAO SU	Loét sọc mặt cạo (Loét sọc miệng cạo)	Pha 20 g/1 lít nước để quét lên vết bệnh

LƯU Ý:

Có thể pha thành dung dịch phun ướt đều tán cây, cũng có thể pha thuốc để quét đối với các bệnh loét sọc miệng cạo cao su và nứt thân chảy nhựa cam quýt, cao su, sầu riêng.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.



THUỐC TRỪ BỆNH CÂY VÀ ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

PYROLAX 250 EC

Thành phần: Pyraclostrobin: 250 g/l

Chất mang, phụ gia: 750 g/l

SPC Xanh, Thêm Xanh



Nhãn hiệu
CARBENZIM
Siêu xanh lá - Siêu to hạt



CÔNG DỤNG

Pyrolax 250EC là thuốc trừ bệnh cây và điều hòa sinh trưởng. Thuốc có khả năng di chuyển trong cây, có tác dụng phòng trị bệnh.

XINAZO 250 SC làm chậm quá trình già hóa của cây, làm lá xanh hơn, làm tăng khả năng chống chịu của cây với các yếu tố bất lợi. Thuốc cũng giúp tiết kiệm sử dụng phân đạm và nước tưới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Tiêu	Thán thư	0,1 % Pha 100ml / 100 lít nước. Phun 500 - 800 lít/Ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
Cà phê		
Lạc (đậu phộng)	Kích thích sinh trưởng	0,45 lít/Ha (Pha 20-25 ml/ bình 25 lít nước) Phun 500 - 600 lít/Ha Phun 2 lần: - Lần 1: Khi cây bắt đầu ra hoa - Lần 2: Khi cây hình thành củ

LƯU Ý:

- Phun ướt đều 2 mặt lá. Nên phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
- Hỗn hợp được với các thuốc phòng trừ sâu bệnh, trừ thuốc có tính kiềm.
- Thuốc có độc tính thấp, an toàn cho môi trường. Có thể độc cho cá.

THỜI GIAN CÁCH LY: Tiêu 7 ngày, Cà phê 45 ngày, Lạc (đậu phộng) 14 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY

Thành Phần: Difenonazole: 150 g/l
Propiconazole: 150 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1lít

Sagograin 300 EC

SPC Xanh, Thơm, Xanh

SA GÔ GỜ REN
SẠCH BỆNH - CỨNG CÂY



CÔNG DỤNG:

- Trong thành phần **SAGOGRAIN 300 EC** chứa 2 hoạt chất Difenonazole + Propiconazole nên không những khả năng tấn công diệt nấm bệnh nhanh mà hiệu lực kéo dài tới 3 tuần.
- **SAGOGRAIN 300 EC** tạo cứng cây, lá xanh và dày, quả, hạt sáng đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
LÚA	Lem lép hạt	0,3 lít/Ha. Pha 12 - 19 ml/bình 16 - 25 lít nước.
	Khô vằn	0,35 lít/Ha. Pha 14 - 22 ml/bình 16 - 25 lít nước.

LƯU Ý:

- Bệnh lem lép hạt: Phun trước khi lúa trổ 5 - 7 ngày và sau khi lúa trổ đều.
- Bệnh khô vằn: Phun khi bệnh chớm xuất hiện trên đồng. Phun lại lần 2 sau 7 ngày.
- Nên phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện.
- Không pha chung với các thuốc có tính kiềm cao.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.



THUỐC TRỪ BỆNH

THỂ HỆ MỚI

Thành phần: Picoxystrobin: 200 g/l
Difenoconazole: 120 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SagoPerfect 320 SC

SPC Xanh, Thơm, Xanh



*** ĐẶC TÍNH VÀ CÔNG DỤNG:**

SAGOPERFECT 320 SC được phối hợp 2 hoạt chất mới nên phổ tác dụng rộng. Thuốc có tính xông hơi và nội hấp mạnh. Sau khi phun, thuốc thấm sâu vào lá, nội hấp vào mạch gỗ và lưu dẫn bên trong đến các bộ phận non của cây.

*** Hướng dẫn sử dụng:** Phòng trừ bệnh thán thư Cà phê.

- Liều lượng: 0,15 %. Pha 150 ml/100 lít nước.

Lượng nước phun 600 - 1000 lít/Ha.

*** Lưu ý:** Phun thuốc khi vết bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5 %. Phun lại lần 2 cách lần thứ nhất 5 ngày. Phun đủ lượng nước theo khuyến cáo.

*** Thời gian cách ly:** Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.



THUỐC TRỪ BỆNH CÂY

SAIPAN 2 SL

Thành Phần:

Kasugamycin 2 % w/w
Dung môi, phụ gia 98 % w/w

SPC Xanh, Thơm Xanh



HIỆU QUẢ SỐ 1



SAIPAN - SINH HỌC - THUỐC HAY!
VI KHUẨN - NẤM BỆNH - THỎI BAY TỨC THÌ

CÔNG DỤNG:

SAIPAN 2 SL là thuốc trừ bệnh cây sinh học. Thuốc có khả năng nội hấp mạnh và trừ được cả nấm và vi khuẩn hại cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Đạo ôn (Cháy lá, khô cổ bông, cổ gié)	1,5 lít/Ha. Pha 50 - 80 ml/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun 400 - 600 lít/Ha.
	Bạc lá (vi khuẩn)	
Bắp cải	Thối nhũn (vi khuẩn)	
Cam	Bệnh loét (vi khuẩn)	0,25 - 0,3%. Pha 250 - 300 ml/100 lít nước. Phun ướt đều tán lá và trái.

LƯU Ý:

- Phun thuốc khi bệnh mới phát sinh.
- Nếu bệnh nặng thì phun lại lần 2 sau lần phun thứ nhất từ 7 - 10 ngày.
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác. Không pha chung với các thuốc trừ sâu vi sinh (như thuốc Bt).

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY

SAIPORA SUPER 350 SC

Thành phần: Iprodione 250 g/l
Hexaconazole 100 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

QUÉT SẠCH NẤM BỆNH

**Cây sạch bệnh
Mùa bội thu**

**SAIPORA
SUPER**

**KHẢ NĂNG NỘI HẤP MẠNH
TRỪ NẤM - HIỆU QUẢ KÉO DÀI**

CÔNG DỤNG:

SAIPORA SUPER 350 SC: Là thuốc trừ bệnh được phối hợp hai hoạt chất, cả hai đều có khả năng nội hấp mạnh, nên có thể phòng trừ nấm bệnh nhanh và kéo dài.

Phổ tác động của thuốc rất rộng, vì vậy có thể phòng trừ được rất nhiều loại nấm bệnh hại trên nhiều loại cây trồng.

*** HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

Phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa.

- Liều lượng 0,6 lít/Ha.

- Pha 30 ml/ bình 25 lít nước.

- Phun 2 bình/ 1000 m².

*** Lưu ý:** Phun sớm khi bệnh mới xuất hiện, với lượng nước đủ theo khuyến cáo.

*** Thời gian cách ly:** Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG

Saizole 5 SC

Thành phần:

Hexaconazole: 50 g/L

Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thêm Xanh

Dùng Saizole Hiệu quả cộng dồn !



CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ bệnh phổ rộng, tác động nội hấp mạnh, hiệu lực trừ nấm nhanh và kéo dài.
- Phòng trừ bệnh khô vằn, lem lép hạt trên lúa, đốm lá trên lạc, chết cây con cà rốt, nấm hồng trên cao su, cà phê.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG PHUN
LÚA	Đốm vằn (khô vằn)	1,0 - 1,2 lít/Ha.
	Lem lép hạt	Pha 40 - 70 ml/bình 16 - 25 lít nước
CÀ RỐT	Chết cây con	1,0 lít/Ha. Pha 40 - 60 ml/bình 16 - 25 lít nước
ĐẬU PHỘNG (lạc)	Đốm lá	0,8 - 1,0 lít/Ha Pha 40 - 60 ml/bình 16 - 25 lít nước
NHO	Phấn trắng	0,2 %. Pha 200 ml/100 lít nước
CAO SU	Vàng rụng lá	0,2 - 0,4 %. Pha 200 - 400 ml/100 lít nước
	Nấm hồng	0,2 - 0,25 %. Pha 200 - 250 ml/100 lít nước
CÀ PHÊ	Nấm hồng	0,25 - 0,3%. Pha 250 - 300 ml/100 lít nước

LƯU Ý: Phun ngừa hoặc phun khi bệnh chớm xuất hiện trên đồng.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH

Samet 25 EC

Thành phần: Triadimenol. 250 g/lít
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm Xanh

ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG, RỈ SẮT



CÔNG DỤNG

SAMET 25 EC là thuốc trừ nấm bệnh nội hấp, phổ tác dụng rộng. Có hiệu lực cao với bệnh phấn trắng và rỉ sắt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Cao su	Bệnh phấn trắng	0,3 - 0,4%. Pha 300 - 400 ml/100 lít nước
Cà Phê	Bệnh rỉ sắt	

LƯU Ý:

Phun thuốc ngay khi bệnh mới xuất hiện (tỷ lệ bệnh 5 - 20%). nếu bệnh nặng có thể phun lại sau 6 - 7 ngày.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước thu hoạch 15 ngày.



THUỐC TRỪ BỆNH CÂY

Sulox 80 WP

Thành phần: Sulfur 80 % w/w
Chất mang, phụ gia: 20 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Nhện hại sạch ngay
- Thổi bay phấn trắng



Nhện gié



Nhện lông nhung



Nhện đỏ



Phấn trắng cao su



CÔNG DỤNG:

- Thuốc có tác động tiếp xúc, xông hơi mạnh, phòng trừ tốt bệnh và nhện hại cây trồng.
- Cung cấp lưu huỳnh cho cây phát triển xanh tốt.
- Thuốc đăng ký trừ nhện gié, nhện lông nhung, bệnh phấn trắng hại cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ	LIỀU LƯỢNG
LÚA	Nhện gié	1,5 kg/Ha. Pha 60 - 90 g/bình 16 - 25 lít nước. Phun 3 bình/1000 m ² .
CAO SU	Bệnh phấn trắng	0,25 - 0,33%. Pha 250 - 330 g/100 lít nước.
XOÀI	Bệnh phấn trắng	1,5 - 2,0 kg/Ha.
LẠC (Đậu phộng)	Bệnh đốm lá	Pha 60 - 80 g/bình 16 lít nước. Phun 2 - 3 bình/1000 m ²
VẢI	Nhện lông nhung	0,375 - 0,5%. Pha 300 - 500 g/ 100 lít nước. Phun ướt đều cây trồng.
NHẪN	Nhện lông nhung	0,3 - 0,5%. Pha 300 - 500 g/100 lít nước. Phun ướt đều tán lá.

LƯU Ý:

- Nên phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, nhện mới nở.
- Nếu bệnh đã phát triển có thể phun lại sau 7 - 10 ngày.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH

TREPPACH BUL 607 SL


Thành phần:

Propamocarb HCL: 607 g/lít
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh



Tờ Rếp Pách Bun Ra Tay
Thối Rễ, Thối Quả,
Thối Cây Phải Ngừng



CÔNG DỤNG:

- Thuốc chuyên dùng trừ nấm gây bệnh thối rễ, thối thân, thối trái, rụng lá, rụng trái, ... Ngoài ra còn dùng để xử lý đất trồng và xử lý cành giâm cây trồng.
- Thuốc xâm nhập nhanh chóng vào cây trồng qua rễ và qua lá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG
HỒ TIÊU	Chết nhanh	0,3 % (1,2 lít/Ha). Pha 300 ml/100 lít nước. Phun ướt đều tán cây và vùng gốc rễ.
DƯA CHUỘT	Sương mai	1,5 lít/Ha. Pha 60 - 90 ml/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun 400 lít/Ha.
CÀ CHUA	Mốc sương (Sương mai)	1,5 - 2,0 lít/Ha. Pha 80 - 120 ml/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun 400 - 500 lít/Ha.
SÀU RIÊNG	Xì mủ	0,25 - 0,3 %. Pha 250 - 300 ml/100 lít nước Phun ướt đều tán lá, thân và gốc cây
CAO SU	Loét sọc mặt cạo	0,5 - 1,0 %. Pha 50 - 100 ml/10 lít nước để quét lên miệng cạo, cách nhau 7 ngày/lần.

LƯU Ý:

- Chú ý tưới đất phải đủ ẩm.
- Có thể pha thành dung dịch phun ướt đều tán cây, có thể pha thuốc rồi tưới quanh gốc cây.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

Dưa chuột 5 ngày. Sầu riêng không xác định.

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY

Trizole

400 SC, 75 WG

Thành phần:
Tricyclazole : 400 g/lít và 75 % w/w

SPC Xanh, Thơm Xanh



Có Trizole - Đạo ôn biến mất !



ĐẠO ÔN CỔ BÔNG



ĐẠO ÔN TRÊN HẠT



ĐẠO ÔN TRÊN THÂN



ĐẠO ÔN TRÊN LÁ

CÔNG DỤNG:

Trizole 75 WG là thuốc trừ nấm có tính nội hấp nhanh vào cây, thuốc đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ bông, thối cổ gié).

Trizole 400 SC là thuốc trừ nấm đạo ôn, có khả năng nội hấp mạnh, vì vậy có hiệu lực nhanh và kéo dài, nên bảo vệ cây lúa được lâu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:


CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG	
		TRIZOLE 400 SC	TRIZOLE 75 WG
LÚA	Đạo ôn (cháy lá)	0,6 lít thuốc/Ha. Pha 30 ml thuốc cho bình 25 lít nước.	0,1 - 0,15 kg/Ha. (100 - 150 g/Ha) Pha 7 - 10 g/bình 16 - 25 lít nước.
	Đạo bông (thối cổ bông, cổ gié)		0,15 - 0,2 kg/Ha. (150 - 200 g/Ha) Pha 10 - 15 g/bình 16 - 25 lít nước. Phun trước trổ và sau khi trổ đều.

LƯU Ý:

- Phun khi ráo sương và không pha chung với phân đạm để phun trừ đạo ôn.
- Thời kỳ phun hiệu quả nhất là lúa sắp trổ và vừa trổ xong.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.





Sạch Bệnh - Xanh Lá

CHUYÊN TRỊ ĐẠO ÔN HẠI LÚA



CÔNG DỤNG

TRIZOLE 75 WP là thuốc trừ nấm có tính nội hấp nhanh vào cây, đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ gié)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Lúa	Đạo ôn lá (cháy lá)	nước , phun cho 500 m2 Phun khi mới có vết bệnh trên lá
	Đạo ôn lá (cháy lá) 0,2 - 0,3 kg/Ha. Pha 7 -10g cho 12 lít nước , phun cho 1 sào Bắc bộ 360 m2. Pha 10 - 15g cho 16 lít nước	0,3 - 0,4 kg/Ha. Pha 10 -13g cho 12 lít nước , phun cho 1 sào Bắc bộ 360 m2. Pha 10 - 20g cho bình 16 lít nước , phun cho 500 m2. Phun vào giai đoạn làm dòng và khi lúa trổ đều.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH

VANICIDE[®] 5 SL

Thành Phần:

VALIDAMYCIN A 5 % w/w
Dung môi, phụ gia ... 95 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

ĐẶC HIỆU TRỪ BỆNH KHÔ VẦN HẠI LÚA, THỐI GỐC KHOAI TÂY, BỆNH NẤM HỒNG CAO SU, LỖ CỔ RỄ CÀ CHUA, BỆNH DO NẤM **Rhizoctonia Solani** GÂY RA.



CÔNG DỤNG:

VANICIDE 5 SL là thuốc trừ nấm sinh học, lưu dẫn. Có hiệu quả phòng trừ rất cao đối với bệnh khô vằn hại lúa, bệnh thối gốc khoai tây, bệnh nấm hồng cao su và lở cổ rễ cà chua. VANICIDE 5 SL rất ít độc đối với người và gia súc, không độc với ong mật và cá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Khô vằn	1,0 lít/Ha. Pha 40 - 60 ml/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun: 400 lít/Ha.
Khoai tây	Thối gốc	
Cao su	Nấm hồng	2,5 lít/Ha. Pha 500 ml/100 lít nước. Lượng nước phun: 500 - 600 lít/Ha.
Cà chua	Lở cổ rễ	1,0 lít/Ha. Pha 30 - 50 ml/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun: 500 lít/Ha.

LƯU Ý:

- Phun thuốc ngay khi bệnh mới phát sinh. Nếu bệnh nặng phun 2 lần cách nhau 7 - 10 ngày.
- Phun thật đều, ướt đẫm lá và thân cây.
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác ngoại trừ thuốc có tính kiềm cao.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH

VANICIDE[®] 5 WP

Thành phần: Validamycin A: 5 % w/w
Chất mang, phụ gia: 95 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh



**Hiệu
TRÁI CÀ**



ĐẶC TRỊ LỞ CỔ RỄ, PHỤC HỒI HỆ THỐNG RỄ

CÔNG DỤNG

VANICIDE 5 WP là thuốc trừ nấm, có hiệu quả phòng trừ rất cao đối với bệnh khô vằn hại lúa và ngô, bệnh lở cổ rễ cà chua.

Cây trồng	Bệnh hại	Liều Lượng
Lúa	Bệnh khô vằn	0,75 - 1,0 kg/Ha. Pha 40 - 60g cho bình 16 - 25 lít nước.
Ngô (bắp)		
Cà chua	Lở cổ rễ	1,0 kg/Ha. Pha 40 - 60g cho bình 16 - 25 lít nước.

LƯU Ý:

Phun thuốc ngay khi bệnh mới phát sinh. Phun ngừa bệnh lở cổ rễ khi mới trồng.
Lượng nước sử dụng: 400 lít nước/Ha.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH PHỔ RỘNG

XINAZO 250 SC

Thành phần: Azoxystrobin 250 g/l
Dung môi, phụ gia đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thơm, Xanh



Thấm sâu - Lưu dẫn



CÔNG DỤNG

XINAZO 250 SC (nhãn hiệu SAGOxystrobin) là thuốc phổ rộng, có khả năng phòng và trị nhiều loại nấm bệnh. Thuốc có thể kháng lại sự hình thành của bào tử nấm, ức chế sự nảy mầm bào tử và sự hình thành của bào tử nấm, ức chế sự nảy mầm bào tử và sự phát triển của sợi nấm bệnh.

XINAZO 250 SC có tính nội hấp mạnh và lưu dẫn trong cây.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Bệnh hại	Bệnh hại	Liều Lượng
XOÀI	Bệnh thán thư	0.06 %, Pha 15 ml/bình 20 - 25 lít nước. (hoặc 120 ml/ Phuy 200 lít nước). Phun: 600 lít/Ha.

LƯU Ý:

Phun khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH

ZIN[®] 80 WP

Thành Phần:

Zineb 80 % w/w
Chất mang, phụ gia 20 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ nấm tác dụng tiếp xúc, có phổ tác dụng rộng nên phòng trừ được nhiều loại nấm bệnh cho nhiều loại cây trồng. Ngoài tác dụng phòng trừ bệnh, thuốc còn cung cấp nguyên tố vi lượng kẽm (Zn) cho cây.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Khoai tây	Mốc sương	1,5 - 2,0 kg/Ha. Pha 60 - 80 g/bình 16 lít nước. Lượng nước phun 400 lít/Ha.
Thuốc lá	Mốc xanh	1,0 kg/Ha. Pha 40 - 60 g/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun 400 lít/Ha.
Lúa	Lem lép hạt	1,5 kg/Ha. Pha 60 - 90 g/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun 400 lít/Ha.

LƯU Ý: - Có thể pha chung với nhiều loại thuốc sâu bệnh khác.

THỜI GIAN CÁCH LY: - Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 6 ngày.

ĐẶC TRỊ: BỆNH MỐC SƯƠNG, MỐC XANH, LEM LÉP HẠT.

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH

ZINEB BUL 80 WP

Thành Phần:

Zineb 80 % w/w

Chất mang, phụ gia 20 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Nguyên liệu của
CHÂU ÂU
Agria SA - Bulgaria



PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ nấm tác dụng tiếp xúc, có phổ tác dụng rộng nên phòng trừ được nhiều loại nấm bệnh cho nhiều loại cây trồng. Ngoài tác dụng phòng trừ bệnh, thuốc còn cung cấp nguyên tố vi lượng kẽm (Zn) cho cây.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Cà chua	Đốm vòng	1,2 kg/Ha. Pha 30 - 50 g/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun: 600 lít/Ha.
Khoai tây	Mốc sương	
Nho	Phấn trắng	1,5 kg/Ha. Pha 250 - 350 g/100 lít nước. Lượng nước phun: 400 lít/Ha.
Cam	Bệnh sẹo	Pha 250 - 400 g/100 lít nước. Lượng nước phun: 400 lít/Ha.
Lúa	Lem lép hạt	1,5 kg/Ha. Pha 60 - 90 g/bình 16 - 25 lít nước. Lượng nước phun: 400 lít/Ha.

LƯU Ý:

- Có thể pha chung với nhiều loại thuốc sâu bệnh khác.

THỜI GIAN CÁCH LY:

- Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 6 ngày.