



SINCE 1989

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

KP1, Đường Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38733666 - Fax: (028) 38733003 - Website: www.spchcmc.vn



Hàng Việt Nam Chất lượng cao liên tục từ năm **2005** đến nay

ISO 9001 : 2015 - ISO/IEC 17025 - ISO 14001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
SAIGON PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

THUỐC TRỪ CỎ



SPC cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng
thỏa mãn ước vọng vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC Xanh, Thêm Xanh

HƯỚNG DẪN AN TOÀN



Đọc kỹ nhãn thuốc
trước khi sử dụng



Mặc quần áo bảo hộ
khi phun thuốc



Không phun thuốc
ngược chiều gió



Tắm rửa thay quần áo
sau khi phun thuốc



Để thuốc xa tầm với
của trẻ em



Không làm nhiễm bẩn
môi trường khi dùng thuốc



SINCE 1989

Lời giới thiệu

Các loại thuốc Bảo Vệ Thực Vật do **Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn** cung ứng bao gồm nhiều chủng loại đang được bà con nông dân mọi miền trong cả nước sử dụng.

Với mục đích phòng trừ dịch hại hiệu quả, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Đội ngũ chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật của Công ty đã không ngừng cải tiến tìm ra những giải pháp hữu hiệu giúp bà con nông dân cả nước đạt được những vụ mùa bội thu.

Để giúp Bà con nông dân hiểu rõ đặc tính, cách sử dụng đúng và an toàn các loại thuốc BVTV do Công ty cung ứng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. **Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn** xin trân trọng giới thiệu tới bà con nông dân cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV này.

Công ty rất mong nhận được những đóng góp quý báu và sự hợp tác hỗ trợ của bà con nông dân, các cơ quan đơn vị và các bạn để phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt.

MỤC LỤC

- 1) Saicoba 500EC
- 2) Dinamic 700WG
- 3) Mizin 500SC
- 4) Mizin 80WP
- 5) Beron 10WP
- 6) Beto 14WP
- 7) Domino 20WP
- 8) Pataxim 55EC
- 9) Bé bụ 30SE
- 10) Bé Bụ 30WP
- 11) Butoxim 5GR
- 12) Butoxim 60EC
- 13) Dipoxim 80WP
- 14) Pesle Super 374SL
- 15) Guang Diu 600WG
- 16) Ansaron 500SC

- 17) Ansaron 80WP
- 18) Xinron 800WG
- 19) Sai-one 15EC
- 20) Fasfix 150SL
- 21) Glu-Trust 200SL
- 22) Simatop 200SL
- 23) Fastoxy 32WP
- 24) Diusinate 268SC
- 25) Yosky 10SL
- 26) Gavan Plus 105OD
- 27) Venus 300EC
- 28) Star 10WP
- 29) Pyanchor Gold 8.5EC
- 30) Pyanchor 5EC
- 31) Pyan-Plus 5.8EC
- 32) Farus 25SC
- 33) Broadsafe 200EC



HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
LIÊN TỤC TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY



THUỐC TRỪ CỎ

SAICOPA 500 EC

Thành phần:

Acetochlor: 500 g/lít.

Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thêm Xanh

Trừ cỏ trên đất cạn



CÔNG DỤNG:

Thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc, diệt nhiều loại cỏ hẹp và lá rộng ở giai đoạn tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm như: Lồng vực, mần trâu, đuôi chồn, mần ri, dền gai, sam, cháo, chác...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG	THỜI GIAN SỬ DỤNG	LIỀU LƯỢNG
Khoai mì (sắn)	Phun ngay sau khi đặt hom từ 0 - 3 ngày	1,0 - 1,2 lít/Ha. Pha 70 - 75 ml/bình 25 lít nước. Phun 1,6 bình cho 1000m ² . hoặc pha 45 ml/bình 16 lít nước, phun 2,5 bình cho 1000m ² .
Mía	Phun sau khi trồng 2 - 3 ngày	
Ngô (bắp)	Phun thuốc sau gieo hạt 0 - 3 ngày	1,2 lít/Ha. Pha 75 ml/bình 25 lít nước, phun 1,6 bình cho 1000 m ² . hoặc pha 45 ml/bình 16 lít nước, phun 2,5 bình cho 1000 m ² .
Đậu phộng (lạc)		

Chú ý: Lượng nước pha 400 lít/Ha.

- Phun thuốc đều mặt ruộng sau khi làm đất lần cuối hoặc sau khi gieo hạt, đặt hom trồng từ 0 - 3 ngày.
- Phun thuốc lúc đất đủ ẩm, nếu đất khô cần tưới cho ẩm trước khi phun.
- Tránh để ruộng đã xử lý thuốc bị động vũng sau cơn mưa.
- Để trừ lúa rài: Phun khi ruộng đủ ẩm và sau phun 12 ngày mới làm đất sạ lúa.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ

DINAMIC 700 WG

Thành phần:

Amicarbazon: ... 700 g/kg

Chất mang, phụ gia: ... 300 g/kg

SPC Xanh, Thêm Xanh



CHUYÊN CHO ĐẤT TRỒNG MÍA



CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, chuyên dùng diệt các loại cỏ lá rộng và lá hẹp (hoà bản) trên cây trồng cạn.
- Tác động tiếp xúc qua lá và lưu dẫn qua rễ.
- Khi phun thuốc cỏ chết chậm nhưng chết tận gốc và hiệu lực kéo dài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	LOẠI CỎ	LIỀU LƯỢNG
MÍA	Cỏ hòa thảo và lá rộng	1,2 kg/Ha. Pha gói 50 g/bình 18 - 20 lít. Phun phủ đều lên mặt đất ngay sau khi trồng mới 1 - 7 ngày hoặc sau khi thu hoạch và đốt lá, (xới đất) 1 - 10 ngày.

CHÚ Ý:

- Lượng nước phun: 400 - 500 lít/Ha.
- Phun đều lên mặt đất không để sót, lỏ.
- Pha thuốc vào nước, khuấy hoặc lắc bình để thuốc và nước phân bố đều trong bình khi phun.
- Không để thuốc bay tạt sang cây trồng khác.
- Thuốc chỉ dùng trừ cỏ trên đất trồng mía, không luân canh với cây trồng khác.
- Nếu pha thêm Ansaron thì thuốc có thể huỷ diệt nhiều loại cỏ từ hạt đến trưởng thành (khi đó trở thành thuốc khai hoang như Hoạt chất Glyphosate đã bị cấm).

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ

MIZIN500 SC

Thành Phần:

Atrazine: 500 g/l

Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít



ĐẶC TRỊ CỎ LÁ RỘNG VÀ LÁ HẸP



CÔNG DỤNG

Minzin 500 SC là thuốc trừ cỏ tác động chọn lọc, nội hấp diệt nhiều loại cỏ nhóm hòa bản và lá rộng hàng niên mọc từ hạt như lồng vực cạn, mần trâu, mần ri, cỏ bông tua, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, cỏ mực, dừa cạn...

Minzin 500 SC chủ yếu trừ cỏ ở giai đoạn sắp mọc (tiền nảy mầm) hoặc cỏ mới mọc còn nhỏ có từ 1 - 2 lá (hậu nảy mầm sớm)

Minzin 500 SC diệt cỏ chết tốt nhưng an toàn cho cây bắp (ngô)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Thời điểm	Liều lượng
Ngô (Bắp)	Phun thuốc sau khi gieo hạt lấp đất từ 0 - 3 ngày	1,5 - 3,0 lít/Ha. Pha 65 - 100 ml/bình 16 lít nước hoặc pha 100 - 150 ml/bình 25 lít. Phun đều lên mặt đất khi cỏ chưa mọc hoặc đã mọc nhưng còn nhỏ (có từ 1 - 2 lá).

LƯU Ý:

- Lượng nước phun 400 - 500 lít/Ha. Hiệu quả trừ cỏ cao khi phun trên đất ẩm, nếu đất khô, cần tưới ẩm trước khi phun.
- Không sử dụng hoặc để thuốc bay tạt sang cây trồng mẫn cảm khác như đậu nành, đậu xanh, đậu.....

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ

MIZIN 80 WP

Thành phần:

Atrazine: 80 % w/w

Chất mang, phụ gia: 20 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

THUỐC TRỪ CỎ NGÔ (bắp), MÍA

HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ cỏ nội hấp, có tính chọn lọc cao, an toàn cho cây trồng. Thuốc xâm nhập qua rễ và lá cỏ, diệt cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm.
- Diệt được nhiều loại cỏ mọc từ hạt trên ruộng ngô, mía, dứa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	CỎ DẠI	LIỀU LƯỢNG
NGÔ (Bắp)	Cỏ hằng năm Cỏ lá hẹp và Cỏ lá rộng	1 - 2 kg/Ha. Pha 80 - 100 g/bình 25 lít nước.
MÍA		3 - 5 kg/Ha. Pha 170 - 250g/bình 25 lít nước.

Lượng nước sử dụng: 400 - 500 lít/Ha.

- Phun thuốc trước khi cỏ mọc (tiền nảy mầm) hoặc sau khi cỏ đã mọc nhưng còn nhỏ (hậu nảy mầm sớm).
- **Trên MÍA** phun ngay sau khi đặt hom khi cỏ chưa mọc hay cỏ đã mọc nhưng còn nhỏ (cỏ 1 - 2 lá), có thể phun sau khi làm đất cho mía để gốc sau thu hoạch.
- **Trên BẮP** phun ngay sau khi tủa hạt, khi cỏ chưa mọc hoặc khi cỏ đã mọc nhưng còn nhỏ (có từ 1 - 2 lá).
- Khi phun thuốc đất càng ẩm càng tốt, nếu đất khô phải tưới ẩm trước khi phun.
- Khi phun tránh để thuốc bay tạt sang cây trồng gần cảm như đậu nành, đậu,...
- Sau khi phun thuốc phải rửa thật sạch dụng cụ phun trước khi dùng thuốc khác.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc 45 ngày trước khi dùng cho gia súc ăn.

THUỐC TRỪ CỎ

BERON 10 WP

Thành phần:

Bensulfuron Methyl : 10 % w/w

Chất mang, phụ gia: 90 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

ĐẶC TRỊ CỎ LÁ RỘNG, CHÁC, LÁC TRÊN RUỘNG LÚA

An toàn không gây ngộ độc cho cây lúa.



CÔNG DỤNG:

- Thuốc diệt trừ cỏ ở giai đoạn hậu nảy mầm sớm tác động qua rễ và lá.
- Dùng cho cả lúa cấy và lúa sạ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	LOẠI CỎ	LIỀU LƯỢNG
LÚA SẠ	Cỏ cháo, chác, lác, vẩy ốc, rau mác, cỏ xà bông, rau mương, rau bợ, rau dứa, cỏ mực.	150 - 200 g/Ha. Pha 15 g/bình 25 lít nước. Phun 1 bình cho 1000m ² . Xử lý thuốc ngay sau khi xuống giống đến 5 ngày sau.

CHÚ Ý:

- Khi phun ruộng lúa cần có mức nước từ 1 - 3 cm.
- Có thể trộn với đất bột hoặc phân bón để rải.

THỜI GIAN CÁCH LY: không xác định.



CỎ MỰC



CỎ XÀ BÔNG



CỎ VẤY ỐC



CỎ CHÁC



RAU MƯƠNG



RAU MÁC BAO

THUỐC TRỪ CỎ CHỌN LỌC

BETO14 WP

Thành Phần:
Bensulfuron Methyl:..... 2 % w/w
Acetochlor:..... 12 % w/w
Chất mang, phụ gia: 86 % w/w

SPC Xanh, Thơm Xanh

CHUYÊN DÙNG TRỪ CÁC LOẠI CỎ TRÊN RUỘNG LÚA CẤY



CÔNG DỤNG

BETO 14 WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tác động hậu nảy mầm sớm, là hỗn hợp của hai hoạt chất Bensulfuron Methyl và Acetochlor lưu dẫn qua lá, thân mầm và rễ cỏ, đặc trị 3 nhóm cỏ hòa bản, chác lác và lá rộng phổ biến trong ruộng lúa. Đặc biệt chất trải bề mặt giúp thuốc trải đều trên mặt ruộng do đó giúp tăng cường hiệu quả diệt cỏ, lại tiết kiệm chi phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Loại cỏ	Liều lượng
Lúa	Cỏ lồng vực, đuôi phụng, cỏ chỉ, cỏ cháo, chác... Rau mác, rau bợ, cỏ xà bông, vẩy ốc, rau mương....	0,3 - 0,6 kg/Ha. Pha 15 g/bình 12 lít nước. Phun cho 1 sào Bắc Bộ 360m2 (hoặc pha 20g /bình 18 đến 20 lít nước, phun cho 1 - 1.5 sào Bắc Bộ 360m2. Vụ mùa: Xử lý thuốc 5 - 7 ngày sau cấy. Vụ xuân: Xử lý thuốc 7 - 10 ngày sau cấy, khi lúa đã bén rễ hồi xanh, cỏ có 1 - 2 lá.

LƯU Ý:

- Khi dùng thuốc, ruộng phải có nước xâm xấp 3 - 5 cm, tiếp tục giữ nước sau khi phun (rải) từ 4 - 5 ngày liền. Không để ruộng khô hoặc nước ngập đến đợt lúa.
- Không để nước ở ruộng có dùng thuốc chảy vào ruộng trồng rau hay trồng cây khác.
- Có thể trộn lượng thuốc cỏ trên với đất bột (khoảng 20 - 30kg đất) hoặc lượng phân bón phù hợp để rải cho 1 Ha, khi rải thuốc cỏ ruộng cần mực nước 3 - 5cm và giữ nước cho ruộng liên tục 4 - 5 ngày.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ **Domino** 20 WP

Thành phần:

Bispyribac-sodium 20 % w/w

Chất mang, phụ gia: 80 % w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh



**DIỆT
CÁC LOẠI CỎ
cho
ruộng lúa**

CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, tác động chọn lọc, nội hấp qua lá và rễ.
- Diệt 3 nhóm cỏ hòa bản, cháo chác và lá rộng như cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực (đặc biệt cỏ lồng vực gốc tím), chác, lác, rau mương, rau mác, cỏ mực, lục bình, rong, vẩy ốc, bạc bợ ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng và đối tượng phòng trừ	Cách dùng
Cỏ ở ruộng lúa gieo thẳng	0,15 - 0,20 kg/Ha. Lúa sạ 8 - 18 NSS (cỏ lồng vực 3 - 6 lá), pha 15 - 20 g/bình 25 lít nước. Phun muộn (cỏ lồng vực 4 - 6 lá) thì dùng liều cao, phun ướt đều cỏ với vòi phun sương mịn. Nếu cỏ lớn và nhiều có thể tăng thêm lượng thuốc.

CHÚ Ý: Cần tháo cạn nước để cỏ tiếp xúc được với thuốc phun. Sau phun thuốc 1 - 2 ngày, cho nước vào ruộng cao khoảng 2/3 chiều cao cây lúa và giữ nước liên tục nhiều ngày cho ruộng, ít nhất 4 - 5 ngày.

THỜI GIAN CÁCH LY: không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ

PATAXIM 55EC

Thành phần:

Butachlor: 27.5% w/w

Propanil: 27.5% w/w

Dung môi, phụ gia: 45%w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh



CHUYÊN TRỊ CỎ
HẠI LÚA



CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ cỏ lưu dẫn qua rễ, tiếp xúc và nội hấp qua lá cỏ.
- Diệt cỏ lá hẹp và lá rộng ở giai đoạn hậu nảy mầm sớm như: lồng vực, đuôi phụng, cháo, chác, rau mương, cỏ bộ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng	Thời Điểm Sử Dụng	Liều Lượng Và Cách Dùng
Lúa sạ và Lúa cấy	4 - 6 ngày sau sạ hoặc cấy	Pha 80 ml/bình 16 lít nước hoặc 120 ml/bình 25 lít nước.
	7 - 9 ngày sau sạ hoặc cấy	Pha 100 ml/bình 16 lít nước hoặc 150 ml/bình 25 lít nước.
	10 - 12 ngày sau sạ hoặc cấy	Pha 120 ml/bình 16 lít nước hoặc 180 ml/bình 25 lít nước.

LƯU Ý:

- Lượng nước: 320 - 400 lít/Ha.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định

THUỐC TRỪ CỎ

BÉ BỤ

30 SE

30 WP

Thành phần:

- Butachlor.
- Bensulfuron Methyl.

SPC Xanh, Thơm, Xanh

**BÉ BỤ - cả 3 nhóm cỏ
đều là chuyện nhỏ.**



CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ cỏ nội hấp qua rễ và lá, trừ cỏ ở giai đoạn tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm.
- Diệt trừ hiệu quả cả 3 nhóm cỏ phổ biến trong ruộng lúa sạ: Hòa bản, chác lác, lá rộng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

BÉ BỤ

CÂY TRỒNG	30 SE	30 WP	THỜI GIAN PHUN THUỐC
Lúa	1,2 lít/Ha.	1,2 kg/Ha.	Phun sau sạ 0 - 3 ngày. Hoặc phun sau cấy 4 - 7 ngày

CHÚ Ý:

- Khi phun thuốc ruộng phải đủ ẩm. Sau phun 1 - 3 ngày phải cho nước vào ruộng và giữ nước.
- Đối với **BÉ BỤ 30 WP** có thể trộn với đất bột hoặc phân bón để rải xuống ruộng để trừ cỏ.



Cỏ cháo

Rau mương

Cỏ bấc

Lác rợn

THUỐC TRỪ CỎ

Butoxim 5 GR

Thành Phần:
Butachlor:..... 50 g/kg
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 Kg

SPC Xanh, Thơm Xanh



Đặc trị cỏ lá hẹp và lá rộng
Có thể trộn cùng với phân bón để rải

CÔNG DỤNG

BUTOXIM 5 GR là thuốc trừ cỏ lưu dẫn, sử dụng tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm, diệt cỏ 1 lá mầm (lá hẹp) và cỏ 2 lá mầm (lá rộng) cho ruộng lúa sạ và lúa cấy như lồng vực, đuôi phụng, cháo, chác, xà bông, mác, mương, vẩy ốc....

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Liều lượng	Cách dùng
Lúa (sạ và cấy)	20 - 25 kg/Ha	Rải thuốc sau khi sạ hoặc cấy từ 3 - 9 ngày khi ruộng có nước xăm xấp 3 - 5 cm , sau rải thuốc 3 - 5 ngày cho nước vào ruộng điều chỉnh mực nước thích hợp cho lúa tăng trưởng.

LƯU Ý:

- Rải thuốc ở thời điểm 3 - 5 ngày sau sạ hoặc cấy dùng liều 20 - 25 kg/ha, nếu rải muộn: 7 - 9 ngày sau sạ dùng liều 25 kg/ha.
- Khi rải thuốc ruộng có mực nước nông 3 - 5 cm và giữ nước liên tục trong ruộng 3 - 5 ngày
- Vụ Đông Xuân (Chiêm Xuân) ở phía Bắc do thời tiết lạnh cây lúa sinh trưởng chậm, chỉ rải thuốc khi lúa đã mọc có 1,5 - 2 lá. Không sử dụng thuốc khi nhiệt độ dưới 18 độ C.
- Để thuốc trải đều trên mặt ruộng, có thể trộn với phân bón hoặc đất, cát để rải.
- Gói thuốc 3 kg đủ diệt cỏ cho 1 công ruộng tầm lớn (1.296m²). Không để ruộng khô, rút nước sau khi rải thuốc

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ

BUTOXIM 60 EC

Thành phần: Butachlor: 600 g/lít
Chất an toàn 100 g/lít
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

» **HIỆU QUẢ - AN TOÀN - TIẾT KIỆM** «



Cỏ Đuôi Phụng



Cỏ Lồng Vực



Cỏ Chác



Rau Mác

CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ cỏ nội hấp qua rễ và các mầm cỏ mới mọc, trừ cỏ ở giai đoạn tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm.
- Diệt trừ được nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng phổ biến trong ruộng lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Đối với BUTOXIM 60 EC có chất an toàn:** phun sau sạ từ 1 - 3 ngày trên nền đất ruộng đã cày, bừa, trực kỹ đất dạng bùn nhão.
- Liều lượng và cách phun xịt:**
 - Lượng sử dụng 1,2 lít /Ha. Phun 320 lít nước/Ha.
 - Pha 90 ml/bình 25 lít nước, phun 13 bình cho 1 Ha (1,3 bình cho 1000m²).
 - Dùng bình phun có "béc" phun sương, phun kỹ, đảm bảo thuốc phủ đều mặt ruộng.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định



THUỐC TRỪ CỎ

DIPOXIM 80 WP

Thành Phần:

Dalapon 80% w/w
Chất mang, phụ gia cho đủ 1 kg

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Chuyên trị
Cỏ hòa bản, Cỏ lá hẹp
đang giai đoạn sinh trưởng mạnh



CÔNG DỤNG

Dipoxim 80 WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp qua lá và rễ, diệt cỏ hòa bản hàng niên và đa niên như cỏ chỉ, bông tua, mần trâu, túc, cỏ mồm, chân gà, san cạp, san nước, lồng vực, đuôi chồn, cỏ mỹ, lau sậy.... và một số cỏ cói lác và lá rộng hàng niên như cỏ lác, dền gai, rau sam....

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Loại cỏ	Liều lượng
Mía	Cỏ hòa bản, cỏ lá hẹp và cỏ lá rộng	3 - 5 kg/Ha. Pha 250 gr/bình 20 - 25 lít nước hoặc 2 kg thuốc trong phuy 200 lít nước. Phun cho mía trồng mới 40 - 50 ngày tuổi hoặc
Xoài		3 - 5 kg/Ha. Pha 250 gr/bình 20 - 25 lít nước hoặc 2 kg thuốc trong phuy 200 lít nước. Phun khi soài trồng trên 3 năm tuổi và cỏ đang tăng trưởng mạnh nhưng chưa ra hoa.
Vùng đất chưa canh tác		3 - 5 kg/Ha. Pha 250 - 300 gr/bình 20 - 25 lít nước hoặc 2 kg thuốc trong phuy 200 lít nước. Phun ướt đều thân và lá cỏ giai đoạn chưa ra hoa

LƯU Ý:

- Pha thuốc với nước trong, dùng que khuấy để thuốc và nước trong bình được trộn đều.
- Khi sử dụng, không pha chung với dầu và thuốc trừ cỏ khác
- Phạm vi diệt cỏ rộng từ cỏ non 2 - 6 lá đến tăng trưởng mạnh nhưng chưa ra hoa
- Nơi cỏ rậm rạp, cần phun chậm để thuốc ướt đều thân và lá cỏ.
- Dùng phễu chụp phun định hướng, và rời phun sát mặt cỏ, tránh để thuốc bay vào lá và đọt non cây trồng

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ

Pesle super 374 SL

Thành phần: Diquat dibromide: 374 g/L
Dung môi đặc biệt, chất tạo màu, tạo mùi
phụ gia cho đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thêm Xanh



TRỪ CỎ

CỎ CHÁY VÀNG SAU 2 GIỜ PHUN



CÔNG DỤNG:


- Tác động tiếp xúc, diệt tất cả các nhóm cỏ ở giai đoạn hậu nảy mầm.
- Hiệu lực diệt cỏ nhanh, chỉ sau phun 2 giờ cỏ đã bắt đầu héo vàng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Đối tượng	Liều lượng và cách sử dụng
Cà phê	Cỏ dại	2,5 - 3 lít/Ha, Lượng nước: 400 - 500 lít. Cỏ 3 - 6 lá (hoặc thấp hơn 15 cm), pha 125 ml/bình 20 - 25 lít nước Cỏ trên 6 lá (cao hơn 15 cm), pha 150 ml/bình 20 - 25 lít nước

CHÚ Ý: Khi phun không để thuốc bay sang cây trồng khác và để tăng hiệu lực diệt cỏ và kéo dài nên hỗn hợp với các thuốc có tính lưu dẫn như Ansaron hoặc Broadsafe.

*** THỜI GIAN CÁCH LY:** không xác định.



Thuốc trừ cỏ **GuangDiu** 600 WG

Thành phần: Diuron: 468 g/kg.
Hexazinone: 132 g/kg
Chất mang, phụ gia: 400 g/kg

SPC Xanh, Thơm, Xanh

THUỐC TRỪ CỎ CHO ĐẤT TRỒNG MÍA



Hiệu lực:
Nhanh - Mạnh - Kéo dài

CÔNG DỤNG:

Guang Diu 600 WG là thuốc cỏ tiền và hậu nảy mầm sớm, tác động chọn lọc, tiếp xúc qua lá và lưu dẫn qua rễ dùng trừ cỏ cho đất trồng mía.

Guang Diu 600 WG diệt cỏ đang nảy mầm và mới mọc còn nhỏ có 3 - 5 lá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Loại cỏ	Liều lượng và cách dùng
Mía	Cỏ hòa thảo và lá rộng	2,1 kg/Ha. Lượng nước 350 - 400 lít/Ha. Pha 130 g/bình 25 lít nước phun khi cỏ 3 - 5 lá

CHÚ Ý:

- Phun ướt đều thân và lá cỏ khi trời im gió hoặc gió nhẹ.
- Khuấy đều sau khi pha thuốc vào nước.
- Không để thuốc phun bay tạt vào cây trồng khác.

* Thời gian cách ly:

Không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ

ANSARON 80 WP 500 SC

Thành phần: Diuron
Dung môi, chất mang, phụ gia

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Có Ansaron
mía xanh, cỏ sạch



CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc xâm nhập vào cây cỏ qua rễ và lá.
- Thuốc trừ cỏ ở giai đoạn tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm. Diệt được nhiều loại cỏ trên ruộng mía, cà phê như cỏ lồng vực cạn, màn trâu, dền gai, thài lài, ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Cỏ hại	Liều lượng	Cách dùng
MÍA	Cỏ lá rộng, cỏ lá hẹp.	1,5 - 2,5 kg/Ha. Pha 65 - 80 g/bình 25 lít nước. Phun 600 - 800 lít nước/Ha.	Phun đều lên mặt đất ngay sau khi đặt hom mía 1 - 3 ngày, hay có thể phun khi mía đã mọc, cỏ còn nhỏ (có 1 - 2 lá) hoặc phun khi làm đất lần đầu cho mía gốc sau thu hoạch. Tránh phun trực tiếp vào ngọn mía.
CÀ PHÊ			Phun khi cỏ chưa mọc hay còn nhỏ (có 1 - 2 lá). Tránh phun trực tiếp vào cây trồng.
SẮN (khoai mì)		1,5 kg/Ha. Pha 65 g/bình 25 lít nước. Phun 600 lít nước/Ha. (hoặc pha 500 g/phuy 200 lít nước, phun 3 phuy/Ha).	Phun đều lên mặt đất ngay sau khi đặt hom sắn (1-3 ngày). Không để ruộng đã phun thuốc bị đọng nước và không để thuốc tiếp xúc với lá và đọt khoai mì.

ANSARON 80 WP

ANSARON 500 SC

Cây trồng	Thời điểm sử dụng	Liều lượng và cách dùng
MÍA	Phun thuốc ngay sau khi đặt hom từ 0- 3 ngày	2,5 - 3,0 lít/Ha. Pha 160 - 180ml/bình 25 lít nước. Phun 1,6 bình/1000 m ² . Phun đều lên mặt đất ngay sau khi đặt hom mía hoặc phun sau khi làm đất lần đầu cho mía gốc đã thu hoạch.

CHÚ Ý: Khi phun thuốc đất phải đủ ẩm
THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

Thuốc trừ cỏ **XINRON** 800 WG

Thành phần: Diuron: 800 g/kg.
Chất mang, phụ gia: 200 g/kg

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Chuyên dùng trừ cỏ cho mía



Chất lượng - Hiệu quả

CÔNG DỤNG:

XINRON 800 WG là thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm sớm, tác động chọn lọc, lưu dẫn qua rễ và qua lá dùng để diệt cỏ cho đất trồng mía.

XINRON 800 WG diệt cỏ trước khi mọc, đang nảy mầm hoặc mới mọc còn nhỏ có 3 - 5 lá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Loại cỏ	Liều lượng và cách dùng
Mía	Cỏ hòa thảo và lá rộng	1,5 kg/Ha. Lượng nước 700 - 900 lít/Ha. Pha 50g/ bình 25 lít nước phun khi mía ở giai đoạn 4 - 6 lá, cỏ 3 - 5 lá và đang phát triển mạnh.

CHÚ Ý:

- Phun ướt đều thân và lá cỏ khi trời im gió hoặc gió nhẹ.
- Khuấy đều sau khi pha thuốc vào nước.
- Không để thuốc phun bay tạt vào cây trồng khác.

*** Thời gian cách ly:** Không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ CHỌN LỌC


Sai-one 15 EC

Thành phần:

Fluazifop-P-Butyl: 150 g/l

Dung môi, phụ gia cho đủ 1lít.

SPC Xanh, Thêm Xanh



CHUYÊN DIỆT CỎ HÒA BẢN

Trên đất trồng Lạc (đậu phộng), Vùng (mè)



CÔNG DỤNG:

Sai-one là thuốc nội hấp, diệt cỏ đã mọc lá, an toàn cho đậu phộng (lạc), vùng (mè) và các cây trồng lá rộng khác, hiệu quả cao với cỏ hòa thảo (hòa bản) như: cỏ chỉ, cỏ ống, lồng vực, mần trâu, cỏ mật, cỏ bông tua, cỏ lá tre, cỏ túc, cỏ sâu róm, ...


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG	LOẠI CỎ	LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Lạc (đậu phộng)	Cỏ hòa thảo (hòa bản) các loại	0,8 - 1,0 lít/Ha. Pha 60 ml/bình 25 lít nước, Phun sau khi gieo hạt 9-14 ngày (cỏ có từ 3-6 lá).
Vùng (mè)		1,0 lít/Ha. Pha 60 ml/bình 25 lít nước. Phun sau khi gieo hạt 7 - 8 ngày.

LƯU Ý:

- Lượng nước sử dụng: 400 lít/Ha. Phun 1,6 bình 25 lít nước cho 1000m².
- Nên phun thuốc khi cỏ có 3 - 6 lá vì thời điểm này toàn bộ hạt cỏ trên ruộng đã mọc hết.
- Hiệu quả trừ cỏ cao khi đất đủ ẩm.
- Thuốc không có tác dụng đối với nhóm cỏ lá rộng và cỏ lác.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định



THUỐC TRỪ CỎ

THẾ HỆ MỚI

FasFix 150 SL

Thành phần:

Glufosinate Ammonium 150 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thơm Xanh

CHẤT LƯỢNG

Số 1

**CỎ CHẾT
NHANH**



CÔNG DỤNG:

FASFIX diệt mọi loại cỏ khi tiếp xúc với thuốc (khai hoang). Không hại rễ cây trồng, thuốc có chứa chất hoạt động bề mặt đặc biệt, có khả năng loang trải và bám dính tốt.

FASFIX diệt cỏ mới mọc đến khi đã lớn, tác động tiếp xúc, không chọn lọc, nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng cháy khô nhanh sau 2 - 3 ngày phun thuốc và chết sau đó.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng: Cà phê. **Loại cỏ:** Cỏ các loại.

Liều lượng: 2,0 - 3,0 lít/Ha. Pha 80 - 120 ml/bình 16 lít nước hoặc 125 - 185 ml/bình 25 lít nước.

- Lượng nước phun: 320 - 400 lít/Ha.
- Ruộng nhiều cỏ phun với lượng nước cao.
- Tránh để thuốc bay vào lá cây trồng khi phun thuốc.
- Rửa bình bơm ngay sau khi phun thuốc.

* **THỜI GIAN CÁCH LY:** không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ

Glu-trust 200 SL

Thành Phần:

Glufosinate Ammonium 200 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thêm Xanh



CÔNG DỤNG

Glu - trust (nhãn hiệu 200 FASFIX) diệt cỏ mới mọc đến khi đã lớn, tác động tiếp xúc, không chọn lọc, nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng cháy khô nhanh sau 2 - 3 ngày phun thuốc và chết sau đó.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Loại cỏ	Liều lượng
Cà phê	Cỏ dại	3,0 lít/Ha. Pha 100 ml/bình 16 lít (hoặc 150 ml/bình 25 lít nước). Lượng nước phun: 500 - 600 lít/Ha. - Phun khi cỏ đang phát triển, phun ướt đều thân và lá cỏ. - Khi phun tránh để thuốc bay vào lá cây trồng. - Rửa bình bơm ngay sau khi phun thuốc.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ

Simatop 200 SL

Thành Phần:
Glufosinate Ammonium 200 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm Xanh



CÔNG DỤNG

Simatop (nhãn hiệu FASFIX Hai trăm) diệt cỏ mới mọc đến khi đã lớn, tác động tiếp xúc, không chọn lọc, nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng cháy khô nhanh sau 2 - 3 ngày phun thuốc và chết sau đó.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Loại cỏ	Liều lượng
Cà phê	Cỏ dại	3,0 lít/Ha. Pha 100 ml/bình 16 lít nước hoặc 150ml/bình 25 lít nước). Lượng nước phun: 500 lít/Ha. - Phun khi cỏ đang phát triển, phun ướt đều thân và lá cỏ. - Khi phun tránh để thuốc bay vào lá cây trồng. - Rửa bình bơm ngay sau khi phun thuốc.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ

FASTOXY 32 WP

Thành phần: Glufosinate Ammonium 24 % w/w
Oxyfluorfen 8 % w/w
Chất mang, phụ gia : ... 68 % w/w

SPC Xanh, Thơm Xanh

Công nghệ Mới
Chất lượng Độc đáo



Chuyên trừ
cỏ hàng niên, cỏ đa niên.

ĐẶC TÍNH VÀ CÔNG DỤNG

Fastoxy 32 WP là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, tiếp xúc và hấp thu qua lá, chồi non và rễ diệt trừ nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp hàng niên và đa niên.

Fastoxy 32 WP xâm nhập nhanh vào bộ phận còn xanh ở thân và lá làm cỏ chết sau 3 - 5 ngày phun thuốc, đồng thời hủy diệt luôn hạt cỏ đang nảy mầm và mới mọc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG	LOẠI CỎ	LIỀU LƯỢNG
Cà phê	Cỏ các loại (lá hẹp và lá rộng)	1.6 kg/Ha. Pha 80 g/bình 25 lít nước. Hoặc pha 1 gói cho 1 phuy 200 lít nước.

Chú ý:

Lượng nước phun: 500 lít/Ha. Phun khi cỏ đang phát triển mạnh.
Rà vòi phun sát mặt cỏ, dùng phễu chụp phun định hướng, tránh để thuốc phun bay tạt vào thân lá còn xanh của cây trồng.
Pha thuốc với nước trong, điều chỉnh phun sương mịn và phun ướt đều thân và lá cỏ.
Thời gian cách ly: không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ

Diusinate

268 SC

Thành phần: Diuron 160 g/kg
Glufosinate Ammonium 108 g/kg
Dung môi phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

TRỪ CỎ TRÊN ĐẤT TRỒNG CẠN



CÔNG DỤNG:

Diusinate 268 SC là thuốc trừ cỏ không chọn lọc (khai hoang), tác động tiếp xúc và lưu dẫn, phòng và trừ nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp hàng niên và đa niên từ lúc mới mọc đến khi tăng trưởng mạnh.

Diusinate 268 SC xâm nhập nhanh vào thân lá và rễ làm cỏ vàng chết sau 3 - 5 ngày phun thuốc, đồng thời hủy diệt hạt cỏ đang và sắp nảy mầm trong đất. Cỏ lâu mọc lại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Đối tượng	Liều lượng và cách dùng
CAO SU	Cỏ các loại đang giai đoạn tăng trưởng thân lá xanh tươi.	3.5 lít/ Ha. Pha 180 ml/ bình 25 lít nước hoặc 120 ml/ bình 16 lít nước. Phun khi cây trồng trên 4 năm tuổi, cây có đoạn thân vỏ đã hóa gỗ cao hơn mặt đất 0,5 m.

CHÚ Ý:

- ↻ Lượng nước phun: 500 lít /Ha.
- ↻ Phun sát gần lá cỏ, dùng phễu chụp phun định hướng, và tránh để thuốc phun bay tạt vào lá và thân non của cây trồng.
- ↻ Pha thuốc với nước trong, điều chỉnh phun sương mịn và phun ướt đều lá cỏ.
- * **Thời gian cách ly:** Không xác định.
- + **Lắc kỹ chai thuốc trước khi sử dụng.**

Thuốc trừ cỏ

YOSKY

10 SL

Thành phần: Glufosinate-P 10 % w/w
Dung môi phụ gia 90 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Dô Ky
Cỏ nào cũng quy



CÔNG DỤNG:

YOSKY 10 SL là thuốc trừ cỏ tự nhiên được sản xuất qua tiến trình lên men sinh học của các vi sinh vật trong đất (*Streptomyces*), tác động không chọn lọc, các loại cỏ từ mới mọc đến trưởng thành đều cháy khô và chết nhanh chỉ 2 - 3 ngày sau khi tiếp xúc với thuốc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Đối tượng	Liều lượng và cách dùng
Cà phê	Cỏ các loại	3 lít/Ha. Lượng nước phun 600 lít/Ha. Pha 125 ml/bình 25 lít nước phun khi cỏ đang phát triển mạnh.

CHÚ Ý:

- Pha thuốc với nước trong.
- Phun ướt đều thân và lá cỏ lúc trời im gió hoặc gió nhẹ.
- Tránh để thuốc phun bay vào lá và thân non cây trồng.

* Thời gian cách ly:

Không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ

Gavan Plus 105 OD

Thành Phần:
Mesotrione 75 g/l - Nicosulfuron 30 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

LƯU DẪN 2 CHIỀU, DIỆT NHIỀU LOẠI CỎ

Nhãn Hiệu

ZICO Extra



CÔNG DỤNG

GAVAN PLUS 105 OD là thuốc trừ cỏ chọn lọc, lưu dẫn hai chiều, hấp thu qua cỏ nhóm hòa thảo và lá rộng hàng năm mọc từ hạt như cỏ xay, dền gai, ké đầu muối, đuôi chồn, lồng vực, túc, cỏ lông, cỏ chỉ,.....

GAVAN PLUS 105 OD chủ yếu diệt cỏ đang nảy mầm và đã mọc còn nhỏ có từ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Loại cỏ	Liều lượng
Ngô (Bắp)	Hòa Thảo và lá rộng	1.25 lít/Ha Pha 65 - 75 ml/bình 25 phun sau khi gieo hạt 6

LƯU Ý:

- Lượng nước phun 400 - 500 lít/Ha.
- Hiệu quả trừ cỏ cao khi phun trên đất ẩm, nếu đất khô quá, cần tưới ẩm trước
- Phun sương mịn phủ đều mặt đất lúc trời im gió hoặc gió nhẹ, tránh sót, lòi.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ LÚA

VENUS 300 EC

Thành phần: Pretilachlor 300 g/l
Fenclozim 100 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

LG Chem

*Diệt cỏ sạch trơn
an toàn mầm lúa*



Lúa cỏ



Lồng vực



Đuôi phụng

CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ cỏ nội hấp xâm nhập qua rễ và mầm cỏ.
- Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, chuyên dùng cho lúa sạ và lúa cấy.
- Hiệu quả cao với nhiều loại cỏ trong ruộng lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	LOẠI CỎ	LIỀU LƯỢNG
LÚA GIEO THẲNG (SẠ) LÚA CẤY	Cỏ đuôi phụng, lồng vực, chác, lác, mác bao, xà bông và lúa cỏ, ... trên lúa gieo thẳng (sạ) hoặc lúa cấy.	1,0 lít/Ha. Pha 75 - 80 ml/bình 25 lít nước. Phun 2 bình cho 1000 m ² . Phun sau khi sạ 0 - 4 ngày. Hoặc phun sau khi cấy 1 - 4 ngày

CHÚ Ý:

- Khi phun thuốc mặt ruộng cần bằng phẳng, ẩm ướt dạng bùn nhão, không đọng nước.

THỜI GIAN CÁCH LY: không xác định.



CỎ CHÁO



RAU MÁC BAO



CỎ VÂY ỐC



RAU BỢ



RAU MƯỚNG



CỎ XÀ BÔNG

THUỐC TRỪ CỎ STAR 10WP


LG Chem

Thành phần:

Pyrazosulfuron Ethyl: 10 % w/w

Chất mang, phụ gia: . 90 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh



CÔNG DỤNG:

- Thuốc có tác dụng nội hấp xâm nhập vào cây cỏ qua rễ và lá.
- Thuốc có tác dụng trừ cỏ ở giai đoạn hậu nảy mầm sớm, diệt trừ được nhiều loại cỏ.
- Dùng cho cả lúa cấy và lúa sạ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

LOẠI CỎ	LIỀU LƯỢNG
Lồng vực (cỏ gạo), đuôi phụng, cỏ bấc, cỏ bọ, mác bao, rau dứa, rau mương, rong xanh, cỏ cháo, chác, lác, ...	0,2 - 0,25kg/ha. Pha 15 - 20g/bình 25 lít nước. Phun 1,3 bình/1000m ² (phun 0,6 bình/sào trung bộ 500m ²) - Thời gian sử dụng thuốc: từ 3 - 7 ngày sau khi sạ hoặc cấy. - Hòa vào nước phun khi ruộng có mực nước xâm xấp hoặc có màng nước mỏng, đủ ẩm.

CHÚ Ý:

- Ruộng có nhiều cỏ đuôi phụng vụ trước, nên phun thuốc sớm vào ngày thứ 3 - 5 sau sạ, cấy với liều lượng 250 g/Ha.
- Khi phun ruộng lúa cần có mực nước từ 1 - 3 cm.
- Có thể trộn với đất bột hoặc phân bón để rải.

THỜI GIAN CÁCH LY: không xác định.



Cỏ lồng vực




Cỏ đuôi phụng



Cỏ cháo



Rau mác



Cỏ vẩy ốc



Rau mương

THUỐC TRỪ CỎ

PYANCHOR
GOLD 8.5EC

Thành phần: Pyribenzoxim: ... 2.5 % w/w
Cyhalofop-butyl: 6.0 % w/w
Dung môi, phụ gia: 91.5 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Cỏ con, cỏ mẹ phun **PYANCHOR GOLD**
ẮT LÀ SẠCH HẾT

LG Chem



CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ cỏ chọn lọc, rất an toàn cho cây lúa.
- Thuốc diệt cỏ ở giai đoạn nảy mầm, trừ được nhiều loại cỏ, chuyên dùng diệt cỏ đuôi phụng và lồng vực.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	THỜI GIAN SỬ DỤNG	LIỀU LƯỢNG
Lúa sạ và lúa cấy	7 - 15 ngày sau sạ, cấy	0,8 - 1,0 lít/Ha. Pha 65 - 75 ml/bình 25 lít nước.

LƯU Ý:

- Lượng nước phun: 320 lít/Ha.
- Tháo cạn nước ruộng trước khi phun, sau khi phun thuốc 1 đến 3 ngày dẫn nước vào ruộng cao khoảng 2/3 chiều cao cây lúa và giữ nước liên tục nhiều ngày (ít nhất 4 - 5 ngày).
- Có thể sử dụng liều lượng 1.2 lít/Ha để phun lau lại cỏ đuôi phụng và cỏ lồng vực còn sót lại do trước đó đã phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm.
- Sau khi phun thuốc khoảng 6 giờ nếu trời mưa không cần phun lại.
- Cần khuấy đều dung dịch thuốc trong bình trước khi phun.

THỜI GIAN CÁCH LY: không xác định.



THUỐC TRỪ CỎ

**PYANCHOR
5 EC**

Thành phần:

Pyribenzoxim: 50 g/lít

Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thêm Xanh

*Phun Pyanchor
khỏi lo nhờ cỏ*

 **LG Chem**



Lồng vực



Đuôi phụng



- **Pyanchor 5 EC** diệt nhiều cỏ thuộc nhóm hòa bản, chác lác và lá rộng, đặc biệt rất hiệu lực với cỏ lồng vực cạn, nước (cỏ gạo) ngay khi đã lớn, phun sớm (cỏ lồng vực từ 2 - 4 lá) thì dùng liều thấp, phun muộn (lồng vực 4 - 7 lá) thì dùng liều cao theo bảng hướng dẫn.
- **Pyanchor 5 EC** hấp thu nhanh qua lá cỏ nên sau phun 4 giờ nếu gặp mưa không cần phun lại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	LOẠI CỎ	THỜI GIAN PHUN	LIỀU LƯỢNG
LÚA	Lồng vực cạn, nước (cỏ gạo) và cỏ khác	7 - 12 ngày sau sạ	0,5 - 0,6 lít/Ha. Pha 40 - 50 ml/bình 25 lít nước.
		13 - 21 ngày sau sạ	0,6 lít/Ha. Pha 45 - 50 ml/bình 25 lít nước
	Cỏ đuôi phụng	7 - 12 ngày sau sạ	0,6 lít/Ha. Pha 50 ml/bình 25 lít nước

CHÚ Ý:

- Lượng nước 320 lít/Ha, phun mịn ướt đều lá cỏ, nếu chồng lồi không ảnh hưởng đến lúa.
- Khi phun ruộng cạn nước, nhưng đủ ẩm. Phun xong 1 - 3 ngày cho nước vào ruộng và giữ nước liên tục nhiều ngày, ít nhất 3 - 5 ngày.


THỜI GIAN CÁCH LY: không xác định.



Cỏ cháo



Rau mác



Rau bợ



Cỏ bấc



Lác rận

PYAN-PLUS

THUỐC TRỪ CỎ LÚA

5.8 EC

Thành phần: Pyribenzoxim: 50 g/l
Fenoxaprop-P-Ethyl: 8 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thêm Xanh

DIỆT CỎ LÔNG CÔNG



Hiện
Chim Công



Lúa cỏ



Lông vực



Đuôi phụng

CÔNG DỤNG:

PYAN-PLUS 5.8 EC diệt nhiều loại cỏ phổ biến thuộc cả 3 nhóm: Hòa bản, chác lác và lá rộng, đặc biệt hiệu quả cao với cỏ đuôi phụng và lông vực đã mọc 3 - 4 lá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	LOẠI CỎ	LIỀU LƯỢNG
LÚA SẠ	Đuôi phụng, lông vực, cháo chác, rau mác, xà bông, rau mương.	0,5 - 0,6 lít/Ha. Pha 35 - 40 ml/bình 25 lít nước. Vụ Hè Thu 8 - 14 ngày sau sạ. Đông Xuân 10 - 16 ngày sau sạ.

CHÚ Ý: - Lượng nước phun 400 lít/Ha.

- Tháo cạn nước ruộng 1 - 2 giờ trước khi phun thuốc để cỏ nhô ra khỏi mực nước tiếp xúc được với thuốc cỏ.
- Sau phun 1 - 2 ngày cho nước vào ruộng, giữ mực nước ngang xấp xỉ nửa chiều cao cây lúa, liên tục 3 - 5 ngày (không để ngập ngọn lúa).
- Điều chỉnh vòi phun sương mịn, phun thấm đều lá cỏ khi trời êm gió.
- Cỏ ngừng sinh trưởng ngay sau khi tiếp xúc với thuốc và chết sau đó 7 ngày.
- PYAN-PLUS 5.8EC được nghiên cứu và phối chế theo một tỷ lệ thích hợp nên hiệu quả diệt cỏ cao, an toàn cho cây lúa.



CỎ CHÁO



RAU MÁC BAO



CỎ VẮY ỐC



RAU BỌ



RAU MƯƠNG



CỎ XÀ BÔNG

THUỐC TRỪ CỎ

FARUS **25 SC**

Thành phần: Quinclorac: 250 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

**CHUYÊN TRỊ CỎ
LỒNG VỰC**



CÔNG DỤNG:

- Thuốc tác động chọn lọc, diệt cỏ giai đoạn hậu nảy mầm, đặc trị các loại cỏ nhóm hoà bản như cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, cỏ mỹ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng	Liều Lượng Và Cách Dùng
Lúa	1,0 lít thuốc/Ha. Pha 60 ml/bình 25 lít nước. Lượng nước phun 320 - 400 lít/Ha. Phun thuốc sau khi sạ khoảng 8 - 10 ngày (cỏ lồng vực có từ 2 - 4 lá).

CHÚ Ý: Khi phun thuốc ruộng phải cạn nước nhưng đủ ẩm, sau khi phun được 1 - 2 ngày cho nước vào ruộng và giữ tối thiểu 4 - 5 ngày liên tục, nếu trong ruộng có nhiều cỏ chác lác và cỏ lá rộng thì nên hỗn hợp với các thuốc như Star hoặc Beron.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

BROADSAFE 200 EC

THUỐC TRỪ CỎ

Thành phần:
Quizalofop-P-Ethyl: 200 g/L
Chất phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

CỎ RỒNG ĐỎ
Không lo nhỏ CỎ



Cỏ màn trâu



Cỏ chỉ



Cỏ tặc



Cỏ lồng vực cạn



Cỏ chân gà



Cỏ lá gừng



Cỏ đuôi chồn tre

CÔNG DỤNG:

- Chuyên trừ cỏ hòa bản (1 lá mầm), rất an toàn với cây trồng lá rộng (2 lá mầm).
- Thuốc nội hấp, hiệu lực diệt cỏ hậu nảy mầm tốt nhất khi cỏ có 3 - 5 lá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Liều lượng : 0,4 lít/Ha.
- Pha 25 ml thuốc cho bình 25 lít nước, hoặc pha 200 ml thuốc cho 1 phuy 200 lít nước.
- Phun sau khi gieo đậu 10 - 15 ngày (lúc này cỏ trên ruộng khoảng 3 - 5 lá).

LƯU Ý:

- Không sử dụng trừ cỏ trên cây trồng lá hẹp như lúa, ngô (bắp), mía, ...
- Phun ướt đều lá cỏ và đất phải đủ ẩm.

THỜI GIAN CÁCH LY: không xác định.

