



SINCE 1989

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

KP1, Đường Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38733666 - Fax: (028) 38733003 - Website: www.spchcmc.vn



Hàng Việt Nam Chất lượng cao liên tục từ năm **2005** đến nay

ISO 9001 : 2015 - ISO/IEC 17025 - ISO 14001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
SAIGON PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT**

THUỐC TRỪ SÂU



SPC cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng
thỏa mãn ước vọng vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC Xanh, Thêm Xanh

MỤC LỤC

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1) Aquinphos 40EC | 14) Dioto 250EC | 27) Sago-Super 20EC |
| 2) Bascide 50EC | 15/ Dioto 830WG | 28) Sago-Super 3GR |
| 3) Binhtox 3.8EC | 16) Fenbis 25EC | 29) Saikumi 39.35SC |
| 4) Biocin 16WP | 17) Gà Nồi 4GR | 30) Saimida 100SL |
| 5) Biocin 8000SC | 18) Gà Nồi 95SP | 31) Saivina 430SC |
| 6) Bosago 12AB | 19) Kingspider 93SC | 32) Saliphos 35EC |
| 7) Brimgold 200WP | 20) Mipcide 50WP | 33) Sapen-Alpha 5EC |
| 8) Butyl 10WP | 21) Netoxin 90WP | 34) Saromite 57EC |
| 9) Butyl 400SC | 22) Osago 80 WG | 35) SecSaigon 25EC |
| 10) Butyl 40WG | 23) Roninda 100SL | 36) Sếu đỏ 3EC |
| 11) Comda 250EC | 24) Sagofort 10GR | 37) Sherzol 205EC |
| 12) Comda Gold 5WG | 25) Sagometro 50WG | 38) SK Enspray 99EC |
| 13) Dimenat 20EC | 26) Sago-RAT 0.005RB | 39) Vovinam 2.5EC |



HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
LIÊN TỤC TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY



HƯỚNG DẪN AN TOÀN



Đọc kỹ nhãn thuốc
trước khi sử dụng




Mặc quần áo bảo hộ
khi phun thuốc



Không phun thuốc
ngược chiều gió



Tắm rửa thay quần áo
sau khi phun thuốc



Để thuốc xa tầm với
của trẻ em



Không làm nhiễm bẩn
môi trường khi dùng thuốc



SINCE 1989

Lời giới thiệu

Các loại thuốc Bảo Vệ Thực Vật do **Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn** cung ứng bao gồm nhiều chủng loại đang được bà con nông dân mọi miền trong cả nước sử dụng.

Với mục đích phòng trừ dịch hại hiệu quả, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Đội ngũ chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật của Công ty đã không ngừng cải tiến tìm ra những giải pháp hữu hiệu giúp bà con nông dân cả nước đạt được những vụ mùa bội thu.

Để giúp Bà con nông dân hiểu rõ đặc tính, cách sử dụng đúng và an toàn các loại thuốc BVTV do Công ty cung ứng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. **Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn** xin trân trọng giới thiệu tới bà con nông dân cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV này.

Công ty rất mong nhận được những đóng góp quý báu và sự hợp tác hỗ trợ của bà con nông dân, các cơ quan đơn vị và các bạn để phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt.

THUỐC TRỪ SÂU

AQUINPHOS 40 EC

Thành Phần:

Quinalphos: 400 g/l

Dung môi, chất phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thêm Xanh

Duy nhất tại Việt Nam



CÔNG DỤNG

AQUINPHOS 40 EC có phổ tác động rộng, tác động tiếp xúc, vị độc, xông hơi và thấm sâu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Liều lượng: 1,25 lít/Ha (400 - 500 lít nước).

Liều dùng: Pha 70 - 80 ml/bình 25 lít nước.

Đối tượng dịch hại: Rầy nâu.

LƯU Ý:

Phun khi rầy non mới xuất hiện, phun kỹ nơi có rầy.

Nên phun sáng sớm hay chiều mát.

Thuốc cực độc với nhện gié.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 15 ngày.

THUỐC TRỪ RẦY

BASCIDE 50 EC

Thành Phần:
Fenobucarb: 50 % w/w
Dung môi, phụ gia: 50 % w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh

DỪNG TRỪ Rầy Trên Lúa, Rệp Hại Thuốc Lá



độc. Phòng trừ sâu hại chích hút như rầy hại lúa và rệp hại thuốc lá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
LÚA	Rầy	1,0 - 1,5 lít/Ha. Pha 60 - 75 ml/ bình 25 lít nước.
THUỐC LÁ	Rệp	

LƯU Ý:

- ° Lượng nước sử dụng 400 lít cho 1 Ha.
- ° Thuốc có hiệu lực diệt rầy nhanh, diệt được cả rầy non và rầy trưởng thành.
- ° Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác trừ thuốc có tính kiềm.
- ° Lắc đều chai thuốc trước khi sử dụng.

THỜI GIAN CÁCH LY:

ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 10 ngày.

Thuốc trừ sâu

BINH TOX 3.8 EC

Thành phần:
Abamectin: 38 g/L
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thơm, Xanh

ĐẶC TRỊ: Sâu ăn lá, chích hút
Hiệu quả - An toàn - Thân thiện môi trường



CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ sâu sinh học, được sản xuất qua quá trình lên men vi khuẩn *Streptomyces avertimilis*.
- Tác động vị độc, tiếp xúc và thấm sâu.
- Dùng trừ sâu cuốn lá, sâu keo, sâu tơ, sâu xanh da láng, nhện gié, rầy nâu, rầy xanh, rầy bông, nhện đỏ, bọ trĩ hại.
- Thuốc ít hại thiên địch, con người, gia súc, nhưng độc với ốc, cá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Đối tượng	Liều lượng
Lúa	Sâu cuốn lá, nhện gié	0,2 - 0,3 L/Ha. Pha 15 ml/ 25 lít
Dưa hấu	Bọ trĩ	0,3 L/Ha. Pha 15 ml/ 25 lít
Xoài	Rầy hại bông	0,06 %. Pha 60 ml/100 lít
Đậu tương (đậu nành)	Sâu đục quả	0,25 L/Ha. Pha 12 ml/ 25 lít
Cam	Nhện đỏ	0,09 %. Pha 90 ml/100 lít

CHÚ Ý: Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh khác.
THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU

Vĩ sinh

BIOCIN 16 WP

Thành Phần:

Bacillus Thuringiensis var.
Kurstaki : 16.000 IU bào tử/

mg
SPC Xanh, Thêm Xanh

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG, CON NGƯỜI



ĐẶC TRỊ SÂU ĂN LÁ

CÔNG DỤNG

Biocin 16 WP là thuốc trừ sâu sinh học, diệt sâu qua đường tiêu hóa, chủ yếu diệt sâu ăn lá, không gây tính kháng và hiệu quả trừ sâu đã kháng thuốc hóa học. Thuốc thuộc nhóm độc 4, rất ít độc cho người, gia súc, cá, ong, thiên địch, tuy nhiên độc với tằm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Rau cải(Bắp cải)	Sâu tơ	0,75 - 1,2 kg/Ha. Pha 50 - 60 g/bình 25 lít nước. Phun ướt đều tán lá.
Đậu	Sâu xanh da lán	

LƯU Ý:

- + Nếu phun bằng máy bay (drone) thì pha 0,75 - 1,2 kg cho 30 - 40 lít nước, để phun đều cho 1 Ha.
- + Nên phun khi sâu còn non, phun sáng sớm, trời râm, ít nắng hay chiều mát, chú ý phun phủ đều trên tán lá.
- + Để tăng hiệu lực trừ sâu, có thể pha chung với Sec Saigon 25 EC hay Sapen Alpha 5 EC, pha xong phun ngay.
- + Bảo quản thuốc nơi khô ráo, thoáng mát.
- + Không pha chung với thuốc gốc đồng, thuốc gốc kháng sinh.

THỜI GIAN CÁCH LY:

- + Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 3 ngày.

**THUỐC TRỪ SÂU
VI SINH**

BiOCiN
8000 SC

Thành Phần:

Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki: 8.000 IU/mg

SPC Xanh, Thêm Xanh



Đặc trị sâu ăn lá
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
KHÔNG ĐỘC CHO NGƯỜI



CÔNG DỤNG

BiOCIN 8000 SC là thuốc trừ sâu sinh học, chứa độc tố và bào tử vi khuẩn *Bacillus Thuringiensis*, tác động vị độc, diệt sâu qua đường tiêu hóa, sâu ăn phải lá dính thuốc, ngừng ăn, chuyển đen và chết dần.

BiOCIN 8000 SC chủ yếu diệt trừ sâu ăn lá hại cây lương thực như sâu tơ, sâu xanh...

BiOCIN 8000 SC không gây tính kháng cho sâu và hiệu quả trừ sâu đã kháng thuốc hóa học. Thuốc thuộc nhóm độc 4, rất ít độc cho người, gia súc, cá, ong, thiên địch, tuy nhiên độc với tằm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Rau cải(Bắp cải)	Sâu tơ	1,5 - 2,4 lít/Ha. Pha cho 30 lít nước. Phun ướt đều tán lá.
Đậu	Sâu xanh da lán	

LƯU Ý:

- + Nên phun khi sâu còn non, phun phủ đều trên tán lá.
- + Nên phun sáng sớm hay chiều mát.
- + Có thể pha chung với Sec Saigon, Sapen Alpha, pha xong phun ngay.
- + Phun xa nơi trồng dâu, nuôi tằm.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 3 ngày.

THUỐC TRỪ ỐC

BOSAGO

Thành Phần:

Metaldehyde: 120 g/kg.


Bã mồi dẫn dụ, phụ gia: 880 g/kg.

ĐẶC TRỊ ỐC BƯỚU VÀNG - DẠNG BÀ MỒI

12 AB

SPC Xanh, Thêm Xanh

HIỆU QUẢ TỨC THÌ DIỆT CẢ ỐC TỎ, ỐC NHỎ



CÔNG DỤNG

BOSAGO 12AB là thuốc diệt ốc dạng hạt được ép cứng, được hỗn hợp giữa thuốc Metaldehyde và các chất dẫn dụ ốc mạnh nên hiệu lực trừ ốc nhanh, mạnh, triệt để và kéo dài.

BOSAGO 12AB an toàn cho lúa, có thể trộn với giống, phân để rải. Sau khi rải hạt chìm ngay dưới nước nên không bị ảnh hưởng bởi trời mưa.

CÁCH DÙNG

- **Dùng trước khi sạ:** Giữ nước 3 - 5 cm, rải đều thuốc lượng khuyến cáo, giữ nước thêm 1 - 2 ngày, rồi xả, sau đó tiến hành sạ bình thường.
- **Sau khi sạ:** Sau cữ nước đầu tiên (mức nước 3 - 5 cm) rải đều thuốc, tiếp tục giữ nước thêm 1 - 2 ngày để diệt ốc triệt để.
- Ngoài các trường hợp trên, nên rải thuốc
- Ruộng nhiều ốc, nên rải đều ruộng, nếu ốc ít có thể rải nơi nước đọng vũng hay rải dọc theo mương nước.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Không xác định.



THUỐC TRỪ RẦY

BRIMGOLD 200 WP

Thành Phần: Dinotefuran: 50 g/kg
Imidacloprid: 150 g/kg
Chất mang, phụ gia cho đủ 1 kg

SPC Xanh, Thơm, Xanh

RẦY CÓ ĐÁNG CHI, BRIMGOLD HẾT Ý



CÔNG DỤNG:

- **BRIMGOLD 200 WP** là thuốc trừ sâu, hỗn hợp của hai hoạt chất đặc trị côn trùng chích hút là *Dinotefuran* (50 g/kg) và *Imidacloprid* (150 g/kg), nên hiệu lực trừ sâu rầy, bọ trĩ rất nhanh và mạnh. Thuốc có tính phổ rộng, **tác động lưu dẫn**, tiếp xúc và vị độc.
- **BRIMGOLD 200 WP** có liều dùng thấp, được hấp thu nhanh, hiệu lực kéo dài và an toàn cho cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Rầy	0,4 kg/Ha. Pha 30 g/bình 25 lít nước.

LƯU Ý:

- Phun khi rầy mới xuất hiện.
- Nên phun sáng sớm hay chiều mát.
- Tùy mật số rầy trên ruộng, phun tối thiểu 2 bình 16 lít / 1000 m².



THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY

BUTYL 10 WP, 400 SC


Thành Phần:

Buprofezin : 10% w/w và 400 g/lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh



Rầy bông xoài



Rầy xanh chè



Rầy nâu lúa

CÔNG DỤNG:

- Thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc, làm côn trùng không lột xác được mà chết, trứng đẻ ra không nở được.
- Thuốc chủ yếu phòng trừ côn trùng chích hút như rầy, rệp, đặc biệt công hiệu trừ rầy hại lúa, rầy xanh, bọ cánh tơ hại chè.
- Hiệu lực phòng trừ kéo dài, ít hại thiên địch, không gây bộc phát rầy, chậm hình thành tính kháng thuốc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

	CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
10 WP	Lúa	Rầy nâu	0,8 - 1,0 kg/Ha. Pha 70 gam/bình 25 lít. Phun 1 - 1,5 bình cho 1000 m ² .
	Chè (trà)	Rầy xanh	
	Xoài	Rầy bông	
400 SC	Lúa	Rầy nâu	0,1 - 0,125 lít/Ha. Pha 10 ml/bình 25 lít nước.
	Xoài	Rầy bông	Pha 15 ml/bình 25 lít nước. Phun ẩm tán lá

CHÚ Ý: Phun thuốc khi rầy non mới phát sinh, tuổi nhỏ.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU

NEW

BUTYL 40 WG

Thành Phần:

Buprofezin: 40 % w/w
Chất mang, phụ gia: 60 % w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh

ĐẶC TRỊ RẦY LÚA



RẦY BÔNG XOÀI



CÔNG DỤNG

BOSAGO 12AB là thuốc diệt ốc dạng hạt được ép cứng, được hỗn hợp giữa thuốc Metaldehyde và các chất dẫn dụ ốc mạnh nên hiệu lực trừ ốc nhanh, mạnh, triệt để và kéo dài. **BOSAGO 12AB** an toàn cho lúa, có thể trộn với giống, phân để rải. Sau khi rải hạt chìm ngay dưới nước nên không bị ảnh hưởng bởi trời mưa.

CÁCH DÙNG

- **Dùng trước khi sạ:** Giữ nước 3 - 5 cm, rải đều thuốc lượng khuyến cáo, giữ nước thêm 1 - 2 ngày, rồi xả, sau đó tiến hành sạ bình thường.
- **Sau khi sạ:** Sau cũ nước đầu tiên (mức nước 3 - 5 cm) rải đều thuốc, tiếp tục giữ nước thêm 1 - 2 ngày để diệt ốc triệt để.
- Ngoài các trường hợp trên, nên rải thuốc
- Ruộng nhiều ốc, nên rải đều ruộng, nếu ốc ít có thể rải nơi nước đọng vũng hay rải dọc theo mương nước.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Không xác định.

THUỐC TRỪ SÂU

COMDA 250 EC

Thành phần: Petroleum spray oil: 245 g/lít
Emamectin benzoate: 5 g/lít
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh



CÔNG DỤNG:

- **Comda 250 EC** do hỗn hợp của hai hoạt chất *Emamectin* và *dầu khoáng PSO* nên là thuốc trừ sâu phổ rộng, tác động tiếp xúc, vị độc, khả năng bám dính và loang trải mạnh, dùng phòng trừ các loại sâu ăn lá và chích hút trên nhiều loại cây trồng, ngoài công dụng trừ sâu, **Comda 250 EC** còn có tác dụng hạn chế một số bệnh hại do tác động ức chế nảy mầm của bào tử nấm bệnh. **Comda 250 EC** thuộc nhóm độc III.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	ĐỐI TƯỢNG	LIỀU LƯỢNG	CÁCH DÙNG
DƯA HẤU	Bọ trĩ	0.25 - 0,45 lít/Ha	Pha 20 - 30 ml/bình 25 lít nước. Phun 320 - 400 lít nước/Ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1 - 2.
CHÈ	Bọ xít muỗi		
HÀNH	Sâu xanh da láng		
BẮP CẢI	Sâu tơ	0,45 lít/Ha	Phun ước đều cây trồng khi mật độ rệp 5 - 7 con/chùm quả
HOA CÚC	Rệp muội		
CÀ PHÊ	Rệp sáp	0,06 - 0,1%	Phun ước đều khi rầy xuất hiện
XOÀI	Rầy bông		

LƯU Ý: Có thể pha chung với hầu hết các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh khác, ngoại trừ các loại thuốc có hoạt chất Propargite, Carbaryl, Chlorothalonil, các hợp chất có chứa lưu huỳnh, dung dịch Bordeaux. Không phun khi trời quá nóng hay quá lạnh, nếu cần phun trên diện tích nhỏ để kiểm chứng. Cẩn thận với một số cây trồng mẫn cảm như hoa hồng, hoa huệ...

Thời gian cách ly: 3 ngày.

Thuốc trừ sâu **COMDA GOLD 5 WG**

Thành Phần:

Emamectin benzoate: 5 % w/w

Chất mang, phụ gia: 95 % w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh

**Đặc trị: Sâu cuốn lá, Rầy nâu hại lúa
Rầy xanh trên chè.**



CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ sâu sinh học, tác động tiếp xúc, vị độc, khả năng thấm sâu, hiệu lực trừ sâu nhanh, mạnh.
- Diệt trừ côn trùng ăn lá, chích hút, nhện hại,... nhất là các loại sâu đã kháng thuốc.
- Thuốc ít hại thiên địch, phù hợp với chương trình nông sản sạch.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG	CÁCH DÙNG
Lúa	Sâu cuốn lá	0,25 kg/Ha	Phun, pha với 400 - 500 lít nước/Ha (1,5 - 2 bình 25 lít cho 1000m ²). Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ (1-2) mật độ khoảng 10 - 20 con/m ² .
	Rầy nâu	80 - 100 g/Ha	
Cà chua	Dòi đục lá		
Chè	Rầy xanh		
Dứa hấu	Bọ trĩ		
Bắp cải	Sâu tơ	100 g/Ha	
Cam	Nhện đỏ	0,02 - 0,025 % Pha 20 - 25 g/100 lít nước	Phun ướt đều cây trồng. Khi cây ra lộc non hoặc tỷ lệ hại khoảng 9 %
Nhãn	Nhện lông nhung	0,05 - 0,075 % Pha 50 - 75 g/100 lít nước	

CHÚ Ý: Phun thuốc khi sâu, nhện non mới xuất hiện. Phun đủ lượng nước - thuốc khuyến cáo.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 3 ngày.



THUỐC TRỪ SÂU

Dimenat 20EC

Thành Phần:

Dimethoate 20 % w/w
Chất hoạt động bề mặt 2 %
Dung môi, phụ gia 78 %

SPC Xanh, Thêm Xanh



ĐẶC TRỊ RỆP SÁP HẠI CÀ PHÊ

CÔNG DỤNG

Dimenat 20 EC có tác động tiếp xúc, vị độc, khả năng nội hấp mạnh, phòng trừ nhiều loại sâu, nhện hại, hiệu quả cao với sâu nhóm chích hút như rầy rệp bọ xít, ... nhất là rệp sáp. **Dimenat 20 EC** thuộc nhóm độc 5 GHS, độc với cá, ong, gia súc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Cà phê	Rệp Sáp	0,625 - 0,75%. Pha 625 - 750 ml/100 lít nước. Phun ướt đều cây trồng khi sâu mới phát sinh

CÁCH DÙNG

Lượng nước sử dụng: 400 - 1200 lít/Ha

CHÚ Ý:

Không nên pha chung với các loại thuốc có tính kiềm cao như dung dịch Bordeaux.
Tránh phun thuốc vào các thời kỳ cây ra hoa.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Đối với cây dâu tằm: Sau khi phun thuốc 14 ngày mới thu hoạch lá dâu cho tằm ăn.

Thuốc trừ ốc bươu vàng

DIOTO[®]
250 EC

Dioto[®]
830 WG

830 WG: Niclosamide olamine: 830 g/Kg.

250 EC: Niclosamide 250 g/L.

SPC Xanh, Thơm, Xanh



DIOTO Là Diệt ốc tốt



CÔNG DỤNG: - **DIOTO 250 EC** và **830 WG** có hoạt chất là Niclosamide, dạng chế phẩm EC, hàm lượng hoạt chất: 250 gam niclosamide/lít, dạng cốm WG, hàm lượng hoạt chất: 830 gam niclosamide olamine /kg. **DIOTO** là thuốc đặc trị OBV. Thuốc tác động đến chức năng hô hấp và tiêu hoá khiến ốc không hấp thu được oxy và dưỡng chất mà chết. **DIOTO** thuộc nhóm độc III (WHO), không độc cho ong, chim, dê, cừu, độc tính thấp đối với động vật có vú, được WHO khuyến cáo sử dụng trên ruộng lúa trừ ốc bươu vàng. **DIOTO** phân hủy nhanh trong môi trường (dễ phân huỷ bởi ánh sáng), do đó không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của lúa và hệ sinh thái trong nước.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Lúa	Ốc bươu vàng	DIOTO 250 EC: 0,8 - 1,2 lít/Ha. Pha 80-120 ml thuốc với nước, phun cho 1000 m ² . Lượng nước 240 lít/Ha.
		DIOTO 830 WG: 0.6 kg/Ha. Phun khi mực nước trên ruộng 3-5 cm, và tiếp tục giữ nước từ 2-3 ngày. Lượng nước 160 lít/Ha.

LƯU Ý:

- Trước sạ: Trước sạ vài ngày, dẫn nước vào ruộng khoảng 3 - 5 cm, nhử ốc trôi lên rồi rải thuốc theo liều khuyến cáo, tiếp tục giữ nước thêm 1 ngày, rồi xả, sau đó tiến hành làm đất bình thường.
- Sau khi sạ: Ngay khi lấy củ nước đầu tiên (3 - 5 cm), phun thuốc theo liều khuyến cáo và tiếp tục giữ nước để ốc chết triệt để.
- Ngoài các trường hợp trên, nên phun thuốc khi thấy ốc xuất hiện.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định

THUỐC TRỪ SÂU

Fenbis® 25 EC

Thành phần: Fenvalerate: 3,5 % w/w
Dimethoate: 21,5 % w/w
Dung môi, phụ gia: 75 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

ĐẶC TRỊ RỆP BỌ XÍT, BỌ TRÍ



CÔNG DỤNG:

- Đặc điểm nổi trội của thuốc là hiệu quả nhanh, mạnh, kéo dài.
- Tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp, có tính xua đuổi. Phổ tác dụng rộng.
- Sử dụng: Phòng trừ nhiều loại sâu ăn lá, chích hút và nhện hại cây trồng như sâu keo, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hại lúa, sâu tơ, sâu xanh, dòi đục lá, rệp hại rau, dưa, sâu khoang, sâu đục quả, rệp hại đậu, sâu đục nõn, rệp hại mía, sâu ăn lá, bọ xít, rầy, rệp, nhện đỏ hại bông, bọ xít muỗi, rầy xanh, nhện đỏ hại chè, rệp sáp hại cà phê, hồ tiêu, sâu vẽ bùa, ruồi đục quả, rệp, nhện đỏ hại cây ăn quả.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
LÚA	Bọ xít	0,8 - 1,0 lít/Ha. Pha 60 ml/bình 25 lít nước.
ĐẬU TƯƠNG	Rệp	0,75 - 1,2 lít/Ha. Pha 50 - 80 ml/bình 25 lít nước.
ĐIỀU	Bọ trĩ	0,17 - 0,25%. Pha 170 - 250 ml/100 lít nước.

LƯU Ý:

- Cần phun kỹ vào đúng nơi rệp chích hút.
- Trừ bọ xít trên lúa cần phun lúc sáng sớm hay chiều mát.
- Tránh phun lúc lúa đang trổ.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU

GÀ NÒI 4 GR - 95 SP

Thành Phần: Cartap Hydrochloride
Chất mang, phụ gia

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Gà nòi ra tay, sâu nào cũng chết



CÔNG DỤNG:

- Thuốc đặc trị nhiều loại sâu hại và cả trứng trên nhiều loại cây trồng, đặc biệt công hiệu với sâu cuốn lá, sâu đục thân hại lúa.
- Thuốc trừ sâu qua đường tiếp xúc và vị độc, thấm sâu và khả năng nội hấp. Diệt được cả trứng sâu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
GÀ NÒI 95 SP		
LÚA	Sâu đục thân Sâu cuốn lá	0,7 - 0,9 kg/Ha. Pha 50 - 60 gam/bình 25 lít. Phun khi sâu tuổi nhỏ, phun ướt đều tán lá.
GÀ NÒI 4 GR		
LÚA	Sâu đục thân	20 - 25 kg/Ha. Có thể trộn với đất bột hoặc phân để rải xuống ruộng.

CHÚ Ý: - Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện.

THỜI GIAN CÁCH LY: - Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.



THUỐC TRỪ SÂU, TRỪ NHỆN

KingSpider 93 SC

Thành phần: Emamectin 18 g/kg
Spirodiclofen 75 g/kg
Dung môi, phụ gia: 907 g/kg

SPC Xanh, Thêm Xanh



CÔNG DỤNG:

Kingspider 93 SC là hỗn hợp của hai hoạt chất đặc trị nhện là Emamectin (gốc sinh học) và Spirodiclofen (thuốc trừ nhện thế hệ mới), nên diệt trừ được tất cả các giai đoạn trong vòng đời của nhện bao gồm trứng, nhện non và trưởng thành. Do tính bám dính tốt vào lớp sáp trên bề mặt tế bào cây trồng nên thuốc ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, ít bị rửa trôi bởi nước mưa, hiệu lực kéo dài đến 4 - 6 tuần, thuốc ít gây tính kháng thuốc, ít hại thiên địch, thích hợp sản xuất nông sản an toàn, được khuyến cáo dùng trong chương trình IPM và chương trình quản lý tính kháng thuốc RMP (Resistance Management Programme, ngoài nhện hại, do tính năng của hai hoạt chất, **Kingspider 93 SC** còn phòng trị được nhiều loại sâu chích hút, ăn lá như rệp sáp, rệp dính, bọ phấn, rầy mềm, bọ trĩ, bọ xít muỗi, sâu cuốn lá...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	DỊCH HẠI	LIỀU DÙNG
Cam	Nhện đỏ	0,2 %. Pha 200 ml/100 lít nước.

CHÚ Ý: + Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu, bệnh khác.

+ Nên phun sớm khi nhện mới xuất hiện, tuổi nhỏ. Lượng nước dùng: 600 - 800 lít/ha. Cần phun ướt đều hai mặt lá, nhất là mặt dưới, phun nhiều nước, nên phun sáng sớm hay chiều mát, không phun khi đất khô hạn, trời nắng nóng, cây ra hoa.

+ Để tăng hiệu lực phòng trừ, có thể pha với dầu khoáng SK Enspray 99 EC: pha nồng độ: 0,15 % (pha 150 ml dầu khoáng trong 100 lít nước).

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU

MiPCiD€ 50 WP

Thành Phần:


Isoprocarb: 50 % w/w

Chất mang, phụ gia: 50 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh



ĐẶC HIỆU TRỪ RẦY



CÔNG DỤNG:

- **MIPCIĐE 50 WP** là thuốc có hiệu lực nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị côn trùng chích hút như rầy nâu, rầy chống cánh, rầy lưng trắng, rầy xanh, rầy mềm,...
- Tác động tiếp xúc, vị độc, xông hơi và nội hấp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Liều lượng: 0,8 - 1,2 kg thuốc/Ha.
- Pha 50 - 60 g cho bình 25 lít phun ướt đều tán cây.

LƯU Ý:

Phun vào nơi rầy trú ẩn.

- Để hiệu quả kéo dài nên pha với thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng Butyl.

THỜI GIAN CÁCH LY: 14 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU


NETOXIN

90 WP

Thành Phần:

Nereistoxin 90 % w/w
Chất mang, phụ gia 10 % w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh



**PHÒNG TRỪ SÂU XANH HẠI LẠC,
SÂU ĐỤC THÂN VÀ SÂU CUỐN LÁ HẠI LÚA**

CÔNG DỤNG:

Là loại thuốc tác động tiếp xúc, vị độc, có khả năng xông hơi và nội hấp nhẹ, phổ tác dụng rộng.

- ° Phòng trừ có hiệu quả cao với sâu cuốn lá lúa, sâu đục thân hại lúa, sâu xanh hại lạc.
- ° Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác, ngoại trừ thuốc có tính kiềm cao như dung dịch Bordeaux.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lạc	Sâu xanh	0,5 - 0,75 kg/Ha. Pha 25 g/bình 16 lít nước .
Lúa	Sâu đục thân	0,8 kg/Ha. Pha 30 g/bình 25 lít nước.
	Sâu cuốn lá	0,5 - 0,75 kg/Ha. Pha 25 g/bình 16 lít nước.

CÁCH DÙNG

Lượng nước sử dụng 400 lít cho 1 Ha.

CHÚ Ý:

- Thuốc độc cao với cá, không sử dụng trong khu vực nuôi trồng thủy sản.
- Tránh phun thuốc khi cây đang ra hoa, còn ướt do sương hoặc mưa.
- Không phun thuốc cho cây dâu nuôi tằm.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Đối với cây dâu tằm: Sau khi phun thuốc 14 ngày mới thu hoạch lá dâu cho tằm ăn.

THUỐC TRỪ SÂU

Osago 80 WG

Thành phần: Pymetrozine : 60 % w/w
Nitenpyram : 20 % w/w
Chất mang, phụ gia : 20 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Đặc trị: Côn trùng chích hút



Tiêu diệt sâu rầy nhanh
Hiệu lực kéo dài.

CÔNG DỤNG:

OSAGO 800 WG đặc trị côn trùng chích hút, tác động đến hệ thần kinh, hiệu quả tức thời với mọi tuổi sâu. Thuốc có tác động lưu dẫn, thấm sâu, tiếp xúc và vị độc, được cây hấp thu nhanh, ít rửa trôi, lâu phân hủy, hiệu quả triệt để và kéo dài. Thuốc ít ảnh hưởng đến thiên địch, không gây bộc phát, phù hợp với các chương trình sản xuất nông sản sạch.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Sắn (Khoai mì)	Bọ phấn trắng	250 g/Ha. Pha gói 15 g với 20 lít nước.

* CHÚ Ý:

- Lượng nước: 400 - 600 lít/Ha.
- Phun đủ lượng nước thuốc khuyến cáo.
- Phun khi mật độ bọ phấn khoảng 5 - 6 con/lá.
- Nên phun sáng sớm hay chiều mát.
- Có thể pha với các loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh khác.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày



THUỐC TRỪ SÂU

Roninda 100 SL


Thành Phần:

Cyromazine 100 g/L.

Dung môi, phụ gia cho đủ 1 Lit

SPC Xanh, Thơm, Xanh

**Có RONINDA,
Không Dòi Đục Lá**



CÔNG DỤNG:

RONINDA 100 SL là thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng, tác động lên cả trứng và ấu trùng.

- Đặc trị dòi đục lá (sâu vẽ bùa), ruồi đục quả, sâu đục ngọn và trừ muỗi các loại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	DỊCH HẠI	LIỀU LƯỢNG
Cà chua	Dòi đục lá	2,25 lít/Ha. Với dòi đục lá hại cà chua, Pha 150 ml/bình 25 lít nước

LƯU Ý: Lượng nước sử dụng: 400 lít/Ha.

- Phun thuốc khi tỷ lệ hại 5 - 7%.
- Nên phun khi sáng sớm hay chiều mát.
- Có thể pha chung thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh khác.

THỜI GIAN CÁCH LY: - Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.



THUỐC TRỪ TUYẾN TRÙNG PHỔ RỘNG

SAGOFORT 10 GR

Thành phần:
Fosthiazate 10 % w/w
Chất mang, phụ gia 90 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Hiệu quả kéo dài, ít hại môi trường



CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ tuyến trùng tiếp xúc, gốc lân hữu cơ, dạng hạt rải.
- Vừa có tác động tiêu diệt, vừa làm tuyến trùng bất hoạt nên hiệu lực kéo dài.
- Phòng trừ nhiều loại tuyến trùng : Tuyến trùng sưng rễ, tuyến trùng thối rễ, tuyến trùng nang, tuyến trùng đục rễ, tuyến trùng xoắn, tuyến trùng kim, tuyến trùng trắng đầu lá lúa, và tuyến trùng tự do trong đất.
- Thuốc ít độc so với các loại thuốc trừ tuyến trùng hiện có trên thị trường, ít độc với giun đất, cá, ... nên Sagofort 10 GR được xếp vào nhóm thân thiện môi trường.
- Sử dụng để trừ tuyến trùng gây hại cây trồng như chuối, rau cải, cà chua, ớt, tiêu, khoai tây, củ cải, cây ăn trái...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	DỊCH HẠI	LIỀU DÙNG
Tiêu	Tuyến trùng	30 kg/Ha - Lượng nước: 3 - 5 lít/ nọc.

CHÚ Ý: Xử lý khi tuyến trùng xuất hiện, xới nhẹ lớp đất xung quanh gốc, rắc thuốc, lấp đất và tưới nước đều vào gốc.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.



THUỐC TRỪ RẦY

SAGOMETRO 50 WG

Thành Phần:

Pymetrozine : 500 g/Kg

Chất mang, phụ gia : 500 g/Kg

SPC Xanh, Thơm, Xanh



Thế hệ mới đây - Lo gì sâu rầy Yên tâm virus



CÔNG DỤNG:

- Thuốc đặc trị các loại rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh, rầy bông xoài, rệp sáp, ruồi trắng, bọ trĩ, bọ cánh tơ ... hại cây trồng.
- Thuốc dạng cốm tan nhanh và chỉ cần dùng liều lượng nhỏ.
- Không gây tính kháng thuốc, an toàn cho người, ít hại thiên địch, rất an toàn với cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Rầy nâu	0,25 - 0,35 kg/Ha. Pha 25 gam / bình 25 lít nước. Phun 1 - 1,5 bình cho 1000 m ² .

CHÚ Ý:

- Nên phun khi sâu rầy tuổi nhỏ, phun đủ lượng nước và thuốc khuyến cáo.
- Nên phun sáng sớm hay chiều mát.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.



THUỐC DIỆT CHUỘT

SAGO

RAT

0,005 RB

Thành phần:

Brodifacoum: 0,005 % w/w

Phụ gia: cho đủ 100 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh


Đặc tính: Sago Rat 0,005 RB là thuốc dạng bã mỗi, dùng ngay. Diệt các loại chuột hại. Khi ăn phải, thuốc tác động trực tiếp đến hệ tiêu hóa, gây xuất huyết khiến chuột lập tức ngừng cắn phá, gây hại và chết.

Hướng dẫn sử dụng: Liều dùng: 2 kg/Ha.

Rải 5 - 10 viên trước hang chuột hay dọc theo bờ ruộng, mép tường, bọng dẫn nước, lối mòn ... nơi chuột hay đi lại tìm thức ăn, cách 3 - 4 m rải một mỗi. Sau 3 - 5 ngày, kiểm tra, đặt thuốc thêm nếu cần. Thuốc nên đặt buổi chiều tối.

Lưu ý: Cất giữ thuốc nơi kín đáo, xa tầm tay trẻ em, xa nơi tồn trữ thực phẩm. Chuột chết nên thu gom, tiêu hủy, tránh để các vật nuôi ăn xác chuột chết.

Thời gian cách ly: không áp dụng.



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

KP1, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

THUỐC DIỆT CHUỘT

SAGO

RAT

0,005 RB

*SẢN PHẨM PHÙ HỢP
ĐIỀU KIỆN THÀNH THỊ



Thành phần:
Brodifacoum 0.005% w/w

**CÓ CHUỘT
LÀ CO
SAGO RAT**

SĐK: 7987/CNĐKT-BVTV
do Cục BVTV cấp phép.

HOTLINE:

(028) 37730699 - 37731073

THUỐC TRỪ SÂU

SAGO-SUPER

3 GR

20 EC

Thành Phần:
Chlorpyrifos Methyl

SPC Xanh, Thơm, Xanh



ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, SÂU ĐỤC THÂN, BỌ TRĨ, VE SÂU, RỆP SÁP.

CÔNG DỤNG:
SAGO SUPER Là thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ, phổ rộng, tác động tiếp xúc, vị độc và xông hơi mạnh. Đặc trị sâu đục thân, sâu ăn lá và chích hút ... thuốc hiệu quả trừ các côn trùng y tế, thú y, xử lý mối mọt trong kho, côn trùng trong đất như sùng trắng, mối, kiến, dế...
SAGO SUPER 3 GR, dạng hạt, có thể trộn với phân để rải, nhờ tan chậm nên hiệu quả trừ sâu kéo dài, tiết kiệm chi phí phòng trừ.
SAGO SUPER 20 EC dạng nước, dùng trừ côn trùng chích hút như bọ trĩ, rầy, rệp... ngoài ra có thể dùng xử lý hạt trước khi gieo.
Thời gian cách ly: 14 ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

	CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
SAGO SUPER 3 GR	Ngô (Bắp)	Sâu đục trái	20 - 30 kg/Ha. Xới nhẹ, rải, tưới ẩm. Bỏ 7 - 10 hạt vào loa kèn (noãn) ở giai đoạn 30 - 40 ngày. Nên bỏ hai lần cách nhau 7 - 10 ngày để ngừa sâu đục thân.
	Cà phê	Ve sầu	50 - 70 kg/Ha. Rải thuốc khi mật độ ve sầu khoảng 6 - 8 con/m ² . Rải đều quanh gốc cây, rải xong tưới nước đủ ẩm.
	Lúa	Sâu đục thân	15 - 20 kg/Ha. Rải khi bướm bắt đầu xuất hiện, giữ mức nước 3 - 5 cm trong 3 ngày.
	Khoai lang	Bọ hà	30 kg/Ha. Rải lần 1: 20 ngày sau khi trồng. Rải lần 2: cách lần 1 là 20 ngày giai đoạn hình thành củ.
	Mía	Sâu đục thân	40 kg/Ha. Rải lần 1: giai đoạn làm đất, đặt hom. Rải lần 2: cách lần 1 là 15 ngày.
SAGO SUPER 20 EC	Điều	Bọ trĩ	0,25 - 0,33%. Pha 250 - 300 ml nước cho 100 lít nước. Phun ướt đều tán lá.
	Cà phê	Rệp sáp	1,5 - 2,0 lít/Ha. Pha 50 - 60 ml cho bình 16 lít. Phun ẩm tán lá khi rệp mới xuất hiện.

THUỐC TRỪ SÂU

SAIKUMI

39,35 SC

Thành phần:
Flubendiamide: 39,35 % w/w
Dung môi, phụ gia: 60,65 % w/w

SPC Xanh, Thơm, Xanh

**Thuốc trừ sâu ăn lá thế hệ mới nhất,
Diệt được mọi tuổi sâu**



**Hiệu Lực Nhanh,
Mạnh, Kéo Dài.**

CÔNG DỤNG: Saikumi 39,35 SC là thuốc trừ sâu ăn lá thế hệ mới nhất, tác động trực tiếp đến chức năng vận động: hệ cơ côn trùng, khiến sâu trúng thuốc lập tức cơ vận động bị co rút khiến sâu ngừng ăn và chết. Thuốc có tác động tiếp xúc và vị độc, đặc trị nhiều loại sâu ăn lá thuộc nhóm cánh vẩy (Lepidoptera) như sâu cuốn lá, sâu tơ, sâu keo, sâu phao, sâu xanh, sâu xám... trên lúa, rau, đậu, bắp, cây ăn trái, phòng trừ mọi giai đoạn của sâu từ sâu non đến trưởng thành, tuy nhiên không diệt trứng, đặc biệt hiệu quả đối với sâu cuốn lá lúa, sâu tơ bắp cải. Thuốc được cây hấp thụ nhanh, hiệu lực kéo dài, ít bị rửa trôi, không gây tính kháng chéo với các hoạt chất trừ sâu thuộc nhóm cúc, lân hữu cơ, điều hòa sinh trưởng. **Saikumi 39,35 SC** ít độc cho con người, thú vật nuôi, côn trùng thụ phấn, côn trùng có ích sống trên tán lá, tuy nhiên khả năng ô nhiễm nước ngầm, phù hợp cho chương trình IPM, ngoài ra thuốc có thời gian cách ly ngắn, phổ biến từ: 3 ngày (rau ăn lá, rau ăn trái, rau ăn bông...), đến 14 ngày như táo, lê, mận. Với bắp cải: thuốc có thời gian cách ly: 5 ngày.

Saikumi 39,35 SC có chứa 40% lượng hoạt chất Fubendiamide gấp đôi lượng phổ biến trên thị trường (20%), do kích thước hạt siêu mịn (dạng SC), nên hiệu lực trừ sâu nhanh, mạnh, lượng dùng thấp, nên ít hại môi trường.

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Bắp cải	Sâu tơ	200 ml/Ha. Pha gói 10 ml với 25 lít nước Phun 2 bình cho 1000 m ²

CHÚ Ý: - Lượng nước 500 - 600 lít/Ha.

- Phun khi sâu tuổi 1 - 2, mật độ khoảng 3 - 5 con/cây. Phun sáng sớm hay chiều mát.

THUỐC TRỪ SÂU

Saimida

100 SL

Thành Phần:

Imidacloprid: 100 g/l

Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thêm Xanh

ĐẶC TRỊ RỆP SÁP CÀ PHÊ

Xuất xứ
ẤN ĐỘ



CÔNG DỤNG:

SAIMIDA 100 SL là thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn, nội hấp. Có phổ tác động rộng, đặc trị côn trùng chích hút trên cây trồng.

SAIMIDA 100 SL đặc biệt công hiệu trừ côn trùng chích hút trên cà phê như rệp sáp gốc, rệp sáp cành, trái ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
CÀ PHÊ	RỆP SÁP	0,075 % (0.3 - 0.4 lít/Ha.) Pha 25 ml/bình 25 lít nước. Phun ướt đều tán lá.

CÁCH DÙNG

- Lượng nước sử dụng: 400 lít/Ha, phun khi rệp mới xuất hiện và gây hại.

CHÚ Ý:

SAIMIDA 100 SL có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá khác (trừ thuốc có gốc kiềm).

THỜI GIAN CÁCH LY:

Ngưng phun thuốc trước thu hoạch 7 ngày.



THUỐC TRỪ SÂU **SAIVINA** 430 SC

Thành phần:
Carbaryl: 430 gam/L
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh



CÔNG DỤNG:

Saivina 430 SC là thuốc trừ sâu gốc carbamate, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh vận động côn trùng, khiến sâu trúng thuốc bị ngộ độc mà chết.

Saivina 430 SC có tác động vị độc và tiếp xúc, đặc trị sâu ăn lá và chích hút trên nhiều loại cây trồng như bọ xít muỗi, rầy nâu, rệp vảy, rệp sáp, rầy xanh, rầy bông xoài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	DỊCH HẠI	LIỀU DÙNG
Lúa	Rầy nâu	1,0 - 2,0 lít /Ha Pha 80 - 100 ml/bình 25 lít nước

CHÚ Ý: - Lượng nước dùng 500 lít/Ha

- Phun khi rầy mới chớm, tuổi nhỏ. Phun vào gốc nơi rầy sinh sống và gây hại.
- Nên phun sáng sớm hay chiều mát.
- Cần phun đủ lượng nước - thuốc khuyến cáo.
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu, bệnh khác.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.



THUỐC TRỪ SÂU

Saliphos 35 EC

Thành Phần:
Phosalone 35 % w/w
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thêm Xanh

**ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ LÚA, SÂU KEO TRÊN NGÔ,
RỆP SÁP CÀ PHÊ, BỌ XÍT MUỐI HẠI ĐIỀU.**



CÔNG DỤNG:

Sản phẩm của Ấn Độ, diệt sâu cực mạnh, phân hủy nhanh ngoài môi trường. Thuốc phổ rộng, tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu và xông hơi.

Chuyên trị sâu đục nõn, đục quả trên cây bắp (ngô), cây ăn trái. Sâu cuốn lá lúa, rệp sáp trên cây cà phê, măng cầu. Đặc biệt hiệu lực cao với muỗi hành trên lúa, bọ xít muỗi trên cây điều, chè và cây ăn trái.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Sâu cuốn lá	1,5 - 2,0 lít/Ha. Pha 100 - 130 ml/bình 25 lít nước. (60 - 80ml/bình 16 lít nước). Phun 400 lít nước/Ha.
Ngô (bắp)	Sâu keo	
Cà phê	Rệp sáp	0,33%. Pha 330 ml/100 lít nước. Phun 400 - 500 lít nước/Ha, phun khi cà phê có quả non và mật độ rệp sáp khoảng 18 con/chùm quả.
Điều	Bọ xít muỗi	0,33%. Pha 330 ml/100 lít nước. Phun ướt đều tán lá khi bọ xít non mới xuất hiện.

LƯU Ý: Có thể pha chung với các thuốc trừ sâu, trừ bệnh khác

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 15 ngày.

- Lúa, Ngô, Cà phê: 15 ngày.

- Điều: 7 ngày.



THUỐC TRỪ SÂU

SAPEN ALPHA 5 EC



Thành Phần: Alpha cypermethrin 50 g/lít
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

SAPEN ALPHA - XÔNG PHA DIỆT GỌN

- ➡ **HIỆU QUẢ NHANH CHÓNG,**
- ➡ **CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO.**



Bọ xít nhện, vãi



Sâu cuốn lá



Sâu tơ rau



Bọ xít muỗi
hại điều



Sâu hồng
bông vải

CÔNG DỤNG:

- Thuốc trừ sâu phổ rộng diệt trừ được nhiều loại sâu hại trên lúa, rau, bông vải,...
- Thuốc rất độc với cua.
- Tác động tiếp xúc, vị độc, hiệu lực trừ sâu nhanh, mạnh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Sâu cuốn lá	0,3 - 0,5 lít/Ha. Pha 30 - 35 ml/bình 25 lít nước.
Lúa cạn	Bọ trĩ Bọ xít hôi	0,2 - 0,4 lít/Ha. Pha 20 - 30 ml/bình 25 lít nước
Bông vải	Sâu hồng	0,4 - 0,7 lít/Ha. Pha 30 - 45 ml/bình 25 lít nước.
Rau cải Các loại	Sâu tơ	0,3 - 0,5 lít/Ha. Pha 30 - 35 ml/bình 25 lít nước. Phun ướt đều hai mặt lá

CHÚ Ý: Có thể pha chung với thuốc trừ sâu, bệnh khác.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.



THUỐC TRỪ NHỆN

SAROMITE 57 EC

Thành Phần:

Propargite: 570 g/lít

Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít

SPC Xanh, Thơm Xanh

SẠCH NHỆN, MÁT CÂY

THẦN TỐC[®] diệt nhện



CÔNG DỤNG:

- Thuốc đặc trị nhện hại cây trồng, tác động qua đường tiếp xúc và xông hơi, hiệu lực nhanh, mạnh, kéo dài.
- Diệt nhện ở tất cả các giai đoạn, không gây kháng thuốc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Chè	Nhện đỏ	0,3 - 0,5 lít/Ha. Pha 30 - 35 ml/bình 25 lít nước. Phun ướt đều tán lá.
Lúa	Nhện gié	0,4 - 0,5 lít/Ha. Pha 30 - 35 ml/bình 16 lít nước. Phun ướt đều tán lá khi nhện mới xuất hiện.
Nhãn	Nhện lông nhung	0,07 - 0,1%. Pha 70 - 100 ml/100 lít nước. (Không dùng trên cây vải)

CHÚ Ý:

- Phun kỹ cả hai mặt của lá cây và phun nhiều nước

THỜI GIAN CÁCH LY:

- Chè, lúa: ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.
- Nhãn: thời gian cách ly không xác định

THUỐC TRỪ SÂU PHỔ RỘNG[®] **SecSaigon**


Thành Phần: Cypermethrin: 25 % w/w
Dung môi, phụ gia: 75 % w/w.

25 EC

SPC Xanh, Thơm, Xanh

Phòng trừ

**Sâu cuốn lá lúa,
Sâu khoang hại đậu tương
Và sâu hồng hại bông vải**



Sâu cuốn lá

Nhện đỏ

Sâu hồng



CÔNG DỤNG:

SecSaigon 25 EC (Cypermethrine) là thuốc trừ sâu phổ rộng, hiệu lực nhanh, mạnh, thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc, xua đuổi và gây ngán, diệt được nhiều loại sâu ăn lá, chích hút và nhện hại cho nhiều loại cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
LÚA	Sâu cuốn lá	0,4 lít/Ha. Pha 30 ml/bình 25 lít.
BÔNG VẢI	Sâu hồng	0,4 - 0,6 lít/Ha. Pha 40 ml/bình 25 lít.
ĐẬU TƯƠNG	Sâu khoang	0,4 - 0,6 lít/Ha. Pha 40 ml/bình 25 lít.

CHÚ Ý:

- ♦ Phun thuốc khi sâu, nhện non mới xuất hiện. Có thể pha chung với thuốc trừ sâu, bệnh khác.
- ♦ Thuốc độc cao với cá và thủy sinh, không sử dụng trong khu vực nuôi trồng thủy sản.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

Sếu đỏ


3 EC

Acetamiprid 300g/l
Dung môi hòa tan tổng cộng 1 lít

ôn trùng, khi trúng thuốc

độc. Đặc trị côn trùng
ít hại thiên địch.

Có Sếu đỏ Khỏi lo Rầy.



CÂY TRỒNG

SÂU HẠI

LIỀU LƯỢNG

LÚA

RẦY NÂU

1,5 - 2,0 lít/Ha. Pha 80 ml/bình 16 lít nước
hoặc Pha 120 ml/bình 25 lít nước.

CÁCH DÙNG

Lượng nước phun: 400 lít/Ha.

CHÚ Ý:

- + Phun khi rầy mới xuất hiện, rầy non tuổi 1 - 2, phun vào gốc nơi rầy sinh sống và gây hại.
- Nên phun đủ lượng nước, thuốc theo khuyến cáo.
- + Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu, bệnh khác.

THỜI GIAN CÁCH LY:

không xác định vì không sử dụng thuốc kể từ khi lúa trổ.

THUỐC TRỪ SÂU

Sherzol 205 EC

Thành Phần: Cypermethrin: 30 g/l
Phosalone: 175 g/l
Dung môi, chất nhũ hóa cho đủ 1lít

SPC Xanh, Thơm, Xanh

PHÒNG TRỪ SÂU ĂN LÁ, SÂU ĐỤC QUẢ NHÓM CHÍCH HÚT TRÊN CÂY TRỒNG



CÔNG DỤNG: - Sherzol 205 EC là thuốc trừ sâu hỗn hợp giữa 2 hoạt chất Cypermethine 30 g/L và Phosalone 175 g/L, tác động tiếp xúc, vị độc và thấm sâu. Hiệu lực trừ sâu ăn lá và chích hút rất mạnh và kéo dài. Phổ tác dụng rộng, đặc trị sâu cuốn lá, sâu keo, bọ trĩ, sâu xanh, sâu khoang, rầy rệp các loại hại cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Sâu cuốn lá, sâu keo, sâu gai, bọ xít	0,5 - 1,0 lít/Ha. Pha 40 - 50 ml/bình 25 lít nước. Phun 1,5 - 2 bình cho 1000m ² .
Hoa cúc	Rệp, sâu ăn lá, bọ xít	
Đậu Phộng (lạc)	Sâu đục quả, sâu xanh	
Bông Vải	Rầy, sâu xanh	1,0 - 1,5 lít/Ha. Pha 50 - 75 ml/bình 25 lít nước.

LƯU Ý: - Phun thuốc khi sâu còn non, phun đủ lượng nước - thuốc khuyến cáo.

THỜI GIAN CÁCH LY: - Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.



DẦU KHOÁNG

SK-EnSpray 99 EC

Thành Phần:

Petroleum spray oil: 99 % w/w

SPC Xanh, Thêm Xanh

DẦU KHOÁNG SK - HẾT SÂU, CÂY ĐẸP

*Sản phẩm cao cấp
của Hàn Quốc*



CÔNG DỤNG:

- Hiệu quả cao trừ nhện, rệp sáp, các loại rầy, sâu vẽ bùa,...
- Tăng hiệu quả phòng trừ, kéo dài thời gian tác dụng khi kết hợp với các thuốc sâu, bệnh khác.
- Tác động làm sâu hại chết ngạt, xua đuổi sâu bướm và làm ung trứng sâu.
- Không gây tính kháng thuốc, an toàn cho người, ít hại thiên địch, phù hợp với chương trình IPM.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	ĐỐI TƯỢNG	LIỀU LƯỢNG
CÂY CHÈ (TRÀ)	Nhện đỏ	1,5 lít/Ha. Pha 75 ml/bình 25 lít nước. Lượng nước 600 lít/Ha. Phun ướt đều 2 mặt lá.
CAM		0,3 %. Pha 300 ml/100 lít nước. Lượng nước 1000 lít/Ha. Phun khi mật độ nhện 5 con/lá.
NHẪN	Nhện lông nhung	0,5 %. Pha 500 ml/100 lít nước. Phun ướt đều cây trồng, khi ra lá non.
BƯỞI	Sâu hồng đục quả	1 %. Pha 1 lít/100 lít nước. Phun ướt đều cây trồng, khi ra lá non. Sâu đục quả mới xuất hiện.

CHÚ Ý:

- Không pha chung với các thuốc gốc propargite, carbaryl, chlorothalonil, Dimethoate, Lưu huỳnh.
- Không phun khi trời nắng nóng, khi cây đang bị khô hạn hay úng nước

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun trước khi thu hoạch 2 ngày.



THUỐC TRỪ SÂU

VOVINAM 2.5 EC

Thành phần:
Lambda Cyhalothrin: . . 25 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít.

SPC Xanh, Thơm, Xanh



* Đặc tính và công dụng:

VOVINAM 2.5 EC là thuốc trừ sâu nhóm Cúc tổng hợp, tác dụng diệt sâu qua đường tiếp xúc và vị độc, ngoài ra còn có khả năng xua đuổi côn trùng.

VOVINAM 2.5 EC có phổ tác dụng rộng. (Đặc biệt dùng phòng trừ sâu cuốn lá lúa).

VOVINAM 2.5 EC mau phân huỷ trong điều kiện tự nhiên nên ít để lại dư lượng trên nông sản.

* Hướng dẫn sử dụng:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
LÚA	Sâu cuốn lá	0,6 - 0,8 lít/Ha. Pha 35 ml/bình 25 lít nước. Lượng nước sử dụng: 600 lít nước/Ha.
ĐIỀU	Sâu róm	0,1 %. Pha 100 ml/100 lít nước. Phun ướt đều tán lá.

* **Lưu ý:** Phun thuốc khi thấy bướm, sâu nở rộ.

* **Thời gian cách ly:** Lúa 7 ngày, Điều 14 ngày.

Đặc trị: Sâu róm hại Điều, Sâu cuốn lá lúa